२,४ - डी अमाइन साल्ट ५८% एस.एल (खरपतवारनाशक)

२,४-डी एक खरपतवार नाशक है जोकि ज्वार, मक्त१, गेहूं, गन्ना, जलीय खरपतवार, आलू तथा चाय में खरपतवारों की रांकथाम करता हैं।

उपयोग :

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हैक्टअर मात्रा स.तत्व. (कि.ग्रा.)	संरचना (ली.)	पानी को मात्रा (ली.)	अतिंम छिड़काव तथा फसल काटर के बीच अंतराल (दिनो में)
ज्वार	पोला मोथागोखरू, पत्थर चटटा तुलक, लहसुआ हिरन खुरी बड़ी दुधी हजार दाना	१.८	३.०	५००-६००	-
मक्का	पत्थर चटटा जंगली चांलाई बडा गाखरू विसकपडा, बड़ा दुधी बड़ी नूनियां माथा	०.५	०.८६	४००-५००	५०-६०
गेहूँ	चथुआ प्याजी बौंसया सेंजो बंधानियां	०.५-०.७५	०.८५-१.३०	५००-६००	-
गन्ना	मोथा, कंव घास मकरा मकरा ननियां कनकउआ जंगलो जोलाई हिरन खुरी	३.५	६.०	५००	-
जलोय खरपतवार	नलखुम्बी	०.५-१.०	०.८५-१.१०	६००-७००	-
आलू	बथुआ,प्याजी बड़ी दुधी बड़ी नूनियां	२.०	३.५	४००	-
चाय	कंव घास विष खपड़ा	०.८	१.४०	५००	-
बिना फसल परथंनियम		२.६५	४.५	३००-४००	-
का इलाका	जंगली मांधा	२.५	४.५	३००-४००	-

छिड़काव का समय : ज्वार : उगनं के बाद जव ज्वार का पौधा १०-३० से.मी. लम्बा हो जायें। मक्का : उदने मे पहले बुआई के २ से ३ दिन बाद। गेहूँ : उदने के बाद बुआई के ३० से ३५ दिन बाद। गन्ना : उदने से पहले या गन्ने के बोंने के ६ सप्ताह बाद। जलीय खरपतवार : खरपतवार जव अच्छी बढवार हो। आलू : फसल उग मे पहेल। जाय : जव खरपतवार छोटे हो व तेजी में बढ़ रहे हो। बिना फमल का इलाका : जंगलो मोथा, खाली भूमि में मीधा छिड़काव करें। उपयोग का तरीका मुख्य रूप में ब्लेकटे छिड़काव। उपयोग के लिये निर्देश : उपयोग में आने वाले यंत्रः नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, काम्प्रेशन नेपसेक वैटरी स्प्रेयर, और ए.एम.पी.ई.ई.एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर, जिसमें फलैट फैन या फलड जैट नोजेल लगा हो।

प्रयोग की सीमायें तथा सावधानियां : जहो पर आलू, कपास, तम्बाकू, मिच, तथा टमाटर या अगूंर को फसल लो वहो पर उसका प्रयोग न करें। जहा पर मधुक्खियों का प्रभात्र हो वहो पर भी छिड़काव न करें। छिफट स्प्रे न करें। छिड़काव के दो सप्ताह तक किसी भी जानवर को छिड़काव क्षेत्र में न जाने दे। खरपतवार नाशको का संग्रह बीज, उर्वरक, तथा कीटनाशको के साथ न करें और न सूघ तथा न हो खूले हाथो मे प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थों के खाली डिब्बें, तथा पशुखाद्यपदार्थ से दुर रखें। २. मुँह, आँखे तथा त्वचा से बचाव रखे। ३. प्रयोग करते समय श्वसन क्रिया एले। ४. प्रयोग विधी समपन्न होने के बाद दुषित कपडे तथा शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छी तरह धो डाले। ५. प्रसारण विधि चल रही हो उस समय खाना या चबाना धुम्रपान पानी नही करना चाहिये। ६. छिड़काव करते समय सम्पूर्ण सवाधानीया बतनी चाहिए।

विष के लक्षण : कमजोरी, सिरदर्द, मितलौ, दस्त, हाथा और पैरो की मांसपंशियों में ऐंठन, कुछ लोगो को तंज बुखार भी हो सकता है। हृदय गति के रूक जाने से मृत्यु हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करकं उल्टी करायें यह क्रिया यह क्रिया तव तक दोहरातें रहे जव तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाएं यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाये तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से ३. यदि आंख दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रआ में सेलाइन/साफ पानी से उगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि खरपतवारनाशक सांम द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशभः मायोटोनिया या हदय गति के असामान्य होने या रूकने को रोकने के लिए क्विनडाईन दिया जा सकता हैं। लक्षणानुसार ईलाज करें।

भंडारण : १. कीटनाशक युक्त डिब्बों को किसी अलग कमरे में, जिसमें अन्य वस्तुएं जैसे खाने पीने की चीजे न रखी हो, अलग अलमारी में ताला लगाकर रखें। २. अलमारी या कमरे का आकार दवा के किस्म एवं मात्रा पर निर्भर करेगा। ३. संग्रहण के लिऐ बने कमरे या स्थान ढीक, सूखे, हवादार, प्रकाशयुक्त व लम्बे चौड़े होने चाहिये।

पात्रों को नष्ट करना एवं यंत्रों से निकला हुआ पानी और बचा हुआ माल को निपटान : पैकेजों को तोडकर आबादी से दूर मिट्टी में गाड दें। दवा इस्तेमाल किए जाचुके पैकेजों को उनके दुबारा प्रयोग में आने से रोकने के लिए उन्हे बाहर खुला न छोड़े। प्रयुक्त पैकेजों या अवशिष्ट सामग्री तथा उपकरणों के प्रक्षालन का निपटान इस ढंग से करें ताकि पर्यावरण या पानी दूषित न हो।

रासायनिक संरचनाः

२,३-डी ऐसिड टेक्निन (भार के हिसाब से ९७ प्रतिशत स.त. पर आधारित)	: ५९.००% भार/भार
सिक्वेस्टींग एजेंट : डाईमिथाइल अमाइन	: ३०.००% भार/भार
लिगनिन सल्फोनैट	: १.००% भार/भार
डायलूरेंट (एकवा)	: १०.००% भार/भार
कुल	: १००.००% भार/भार

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

२,४-डी एमाइन साल्ट ५८% (गवतनाशक)

२,४-डी अमाईन रसायन एक निवडक रीत्या काम करणरे गवतनाशक आहे. जे जलचर मवते, मका, गहू, उस, बटाटे, चहा आणि मोकळे असलेत्या जमीनीवर सुद्धा आलेत्या नोठया पानाध्या गवताया नाश करते.

वापरम्या पहति :

पीक	रोमांवर सामान्या नाव	प्रति हेक्टर प्रमाण ए.आय. (ग्राम)	फाम्युंलेशन तयार औषध(मि.ली.)	पाण्याचे मिश्रण (ली.)	शेवटयो फवारणी व कांपणीतील अन्तर (दिवस)
ज्वारी	सायप्रस इरिआ स्ट्रि का एसपीपी ट्रान्थरमा एसपीपी ट्रायडेक्स प्रोकम्बन्स डिजेरा अरविंन्सित कन्वलवलस अरवेन्सित यूफोर्बिआ हिट्रा फलान्थस निरूरी	१.८०	३.०	५००-६००	-
मका	ट्रान्थरमा मोनोगाइना अमसन्थस एसपीपी ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस बोहराविआ डिफुसा यकोर्बिआ हिट्रा पोर्दुंबिआ हिट्रा पोर्दुंलाळा ओलेरासिआ सायप्रस एसपीपी	०.५	०.८६	४००-५००	५०-६०
गहू	चेनोपोडिअम अल्वम अत्फोडेलस अत्फोडेलस टेनुफोलस फुमारिआ एसपीपी अरवेन्सित	०.५-०.७५	०.८५-१.३०	५००-६००	-
ऊस	सायप्रस इरिआ डिजिटेरा एसपीपी डाक्टायलोक्टे निअम एजिप्टिम, डिजेरा अविंन्सिस पोर्दुलाका ओलेरासिआ कोमेलिना, बेगालेन्सिस कन्वलवल्स अन्यलवल्स	३.०	६.०	५००	-
जलचर गवत	इकोरिना क्रेसिपस	०.५-१.०	०.८५-१.७०	६००-७००	-
ब्टटा	चेनोपोडिआम अल्वम अत्फोडेलस टंनुफोलिअस कन्वलसिस	२.०	३.५	४००	-
चहा	डिजिटेरा एसपी बोहार्बिआ हिसपिडा	०.८	१.४०	५००	-
मोकव्या	जमिनीत पार्थेनिअम हिस्टेरोफोरस	१.६५-२.५	४.५०-४.३०	३००-४००	-
	सायप्रस रोटन्डस	२.५	४.५	३००-४००	-

वापरायची वेळः ज्वारी : गवत उगवल्यांनं तर -ज्वारी २० ते ३० से.मी.असताना वापरणे. मका : गवत उगवग्या आधी-परणीध्या २-३ दिवसा मंतर. गहू : गवत उगवण्या नंतर-पेरणीध्या ३०-३५ दिवस नंतर. ऊस : उगवण्यानंतर किंवा आधी-पेरणीध्या ६ अठवड्या नंतर. जलचर गवते-गल्ले त्वरेने वढ़त असताना. बटाटे : गवते त्वरे ने वाढत असताना. चहा : गवते त्वरेने वाढत असताना. मोकळ्या जनिनीतः पेरिन्थियम हेस्टरोफोरस-गवते त्वरे ने वाढत असताना. मोळळ्या जमीनीत : पडीक जमिनीवर शिडकाव करावा.

वापरग्याची पद्धत : बहुतेक सगळीळडचे शिडकाव करावा. वापरणय संबंधी ताकीढ : कापूस, बटाटे, मिंर्ची टोमॅटो आणि द्राक्ष यांच्य पिकां जवळ शिडकाव करू नये. या पिकांना दूजा होण्याची शक्यता आहे. मध्माशा असतील अशा ठिकाणीही शिडकाव करू न्ये. शिडकावाच्या वेळीवाऱ्याने पान्याने पसरू देव नये. शिडकाव केलेल्या जागांवासून गुराना दहा आठवडे दूर ठेवावे. बियणए, खेते व कीटनाशके यांच्या जवळ ठेवु नये. श्वासाबरोबर आत घेवू नये. हातावर हातमोजे घायल्या शिवाय मिसळू नये.

सावधानी : १. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थाँ के खाली डिब्बें, तथा पशुखाद्यपदार्थ से दुर रखें। २. मुँह, आँखे तथा त्वचा से बचाव रखे। ३. प्रयोग करते समय श्वसन क्रिया एले। ४. प्रयोग विधी समपन्न होने के बाद दुषित कपडे तथा शरीर के विभिन्न अंगों को अच्छी तरह धो डाले। ५. प्रसारण विधि चल रही हो उस समय खाना या चबाना धुम्रपान पानी नही करना चाहिये। ६. छिड़काव करते समय सम्पूर्ण सवाधानीया बतनी चाहिए।

विषवाधेची लक्षणेः शरीरावर परीणाम झालेल्या रोग्यास असक्तपणा वाटतो स्नायुमधे शिथीलाता येते तोड व हातपाय गळून जातात व माये स्पेनिया आणि ह्यदय क्रियंवर परिणाम लक्षणए दिसून येतील.

प्रथमोपचाराचे उपायः १. गिळले गेत्यास घशात बोटे घालून उलटी काढ। जो पर्यात पोटात गेलेले संपूर्ण द्रव्य बहर येत नाही. २. जर शरीरावर पडल्यास खूप पाण्याने धुवावे. ३. भरपुर ताजे पाणी वापरून डोळे १०-१५ मिनिट साघी हबके मारून धुवा. ४. जर श्वासनात गेल्यास, रोग्याला मोकळ्या हवेत न्या.

औषधोपचार : मायोटोनिया या हदय गति के असामान्य होने या रूकने को रोकने के लिए क्विनडाईन दिया जा सकता हैं। लक्षणानुसार ईलाज करें।

संग्रहणः १. कीटनाशक असलेली पाकीटे यांचे संग्रहण स्वतंत्र वेगळया खोल्यांमधे कींवा आवारांत करावे वहे स्थान अन्य वस्तू. पदार्थ यांच्या संग्रहणसाठी वापरत्याजाणाऱ्या स्थानापासून दूर असावे विषेशातः खाद्य पदार्थ संग्रहण स्थानापासून. ही पाकीटे स्वतंत्र व वेगळया अशा कपाटांमध्ये कडी कुलुप लावून देखील ठेवता येतील परंतू अशी व्यवस्था कीटनाशकाचा प्रकार आणि त्याचे परिमाण यावर अवलंबून राहील. २. कीटनाशक संग्रहणासाठी निवडलेल्या खोल्या अगर इमारत ही मजबूत बांधणीची भरपूर प्रकाशमय, खेळती हवा असणारी कोरडी आर्णि पुरेश्या आकारमांनाची असायवाच हवी जेणे करून बाष्पामुळे होणारे प्रदुषण टाळता येईल.

रिकाम्या डब्बांची बिल्हेवाट : १. रिकाम्या डब्यांची तोडफोड करून त्यांना रहीवासी वसतीवासून दुर अशा ठीकाणी जमिनीत गाडून टाकावे. २. रिकामी पाकीटे बाहेर आहेत तशीच पडून राहु देवू नयेत जेणे करून त्यांच्या पुनरूयोगास प्रतिबंध बसेल. ३. रिकामी पाकीटे, वापरून ऊरलेली अतिरिक्त सामग्री, तसेच फवारणी साठी वापरलेली साधने व भांडी यांना धुवुन पडलेले सांडपाणी हया सगळयांची बिल्हेवाट सुरक्षित पध्दतीने लावावी जेणे करून पर्यावरण व पाणी यांचे प्रदुषण होण्यास प्रतिबंध घातला जाईल.

रासायनिक संरचना :

२,४-डी अमिने सॉल्ट टेक. (९५% व/व ए.ऐ. वर आधारित)	:५९.००% व/व
प्रच्छादक डिनिथाईल अमिने	: ३०.००% व/व
लिगनिंग सल्फोनेट	: १.००% व/व
विरलकारक (पाणी)	: १०.००% व/व
एकूण	: १००.००% व/व

खबरदारी : लेबल / हस्तपत्रिकेत निर्देशित पीकां व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरू नये.

RACCOLTO ®

FIREFOOT

2,4-D AMINE SALT 58% S.L. (HERBICIDE)

ఫైర్‌ఫుట్

2-4 డి అమైన్ సాల్ట్ 58% యస్.ఎల్..
(కలుపునాశిని)

फाइरफूट

२,४-डी अमाइन साल्ट ५८% एस.एल.

(खरपतवारनाशक)

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ವಿಷ
जहर
POISON
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :
RACCOLTO AGRITECH INDIA PRIVATE LIMITED
13, Maniba Estate, B/H, Kanchan Pharma, Aslali Bypass Road, Aslali-382 427. Dist. Ahmadabad, Gujarat-382 427..
Manufacturer Premises : Shed No 7/1,Ghanshyam Industrial Estate, Sanand- Viramgam Highway, Iyava- Vasana, Sanand -382110, Gujarat
Customer Care No.: 8200006100.
E-mail:contact@raccolto.in

Mfg. Lic. No. : GJ-KHE-01119,. dt. 07/07/2021

Reg.No.:CIR-181632/2021-2,4-D Amine Salt (SL) (428)-739

For Agriculture use only

2, 4-ಡಿ, ಅಮೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ 58% ಎಸ್.ಎಲ್. (ಕಳೆನಾಶಿನಿ)

2,4-ಡಿ ಅಮೈನ್ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಥೆಸೈಜರ್‌ದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾದ ಎಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕಿಜೋಳ. ಗೋಧಿ. ಕಬ್ಬು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಚಿಹ್ನಾ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಇದು ಕೆಲವು ಜಲೀಯ ಕಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಎ.ಐ.	ಪರಿಮಾಣ ಹಿಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ (ಗ್ರಾಂ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ಮಿ.ಲಿ.)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಗಗೆ ನಡುವೆ ಸಿಗ್ಗಿಕೆ
ಶೊರಾಮ್	ಸೈಪ್ರಸ್ ಇರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಿಗಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಪ್ರಥಮಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಡಿಚೆರಾ ಆರ್ಬಿಕಾನವು ಕತವಲ್ಲಸ್ ಆರವತ್ರಿಸ್ ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾ ಹಿರ್ಟಾ ಫೈಲಾನಸ್ ನಿರುರಿ	8.0	3.0	500-600	-
ಮೆಕ್ಕಿಜೋಳ	ಟ್ರೋಥಮ್ಯಾಮೈನೋಗ್ನೆನಾ ಅಗಾರಾನ್ಸ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಟ್ರೈಲಸ್ ಟೇರಿಸ್ಟ್ರಸ್ ಹೋರಾಪಿಯಾ ಡಿಫ್ಯೂಸಾ ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾ ಹಿರ್ಟಾ ಪೋರ್ಟುಲಾಕಾ ಓಲೇರಾಸಿಯಾ ಸೈಪ್ರಸ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ.	0.5	0.86	400-500	50-60
ಗೋಧಿ	ಚೆನೋಪೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಬಮ್, ಡೇಸಿಪೋರಸ್ ಫುಮಾರಿಯಾ ಎಲ್.ಪಿ.ಪಿ. ಮೇಲಿಲೋಟಸ್ ಅಲ್ಬಾ ಕನ್ವಲಸ್ ಆರ್ವೆನ್ಸಿಸ್	0.5-0.75	0.85-1.30	500-600	-
ಕಬ್ಬು	ಬೋಲವರ್ಮ್ ಡಿಚಿಟಾರಿಯಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಡೆಲ್ಟೆಸೋಕ್ಟೆನಿಯಮ್ ಎಜಿಪ್ಟಿಕಮ್ ಡಿಚೆರಾ ಆರ್ಬಿಸ್ಟ್ರಸ್ ಪೋರ್ಟುಲಾಕಾ ಒಲೆರಾಸಿಯಾ ಕೋಮೆಲಿನ್ ಚೆಕಾರಿಯಾ ಕನ್ಕೋಲ್ವಸ್ ಆರ್ವೆನ್ಸಿಸ್	3.0	6.0	500	-
ಎಕ್ಕಾಟಕ್	ಇಚೋರ್ಬಿಯಾ	0.5-1.0	0.85-1.70	500-700	
ಆಲುಗಡ್ಡೆ	ಚೆನೋಪೋಡಿಯಂ ಅಸ್ಫೋಡೆಲಸ್ ಮೆಮೋಲಿಸ್ ಕನ್ವಲ್ಲಿಸ್ ಅರ್ವೆನ್ಸಿಸ್ ಪೋರ್ಟುಲಾಕಾ ಒಲೆರಾಸಿಯಾ	2.0	3.5	400	
ಟೀ	ಡಿಚಿಟಾರಿಯಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಬೋಹಾರ್ಬಿಯಾ ಹಿಸ್ಪಾ	0.8	1.40	500	
ಬೆಳ ಇಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರದೇಶ ಪಾಡೇಸಿಯಮ್ ಹಿಸ್ಟೆರಿಯಾ ಸೈಪರ್ ರೋಟುಂಡಸ್	2.65-2.5 2.5	4.50-4.30 4.5	300-400 300-400	- -

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ : ಈ ಮೊತ್ತಲು 10-20 ಸೆ.ಮಿ. ಪೊಡುಗು ಎಡಿಗಿಸ ತರುವಾತ ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ಪಚ್ಚಿಸ ತರುವಾತ ಮೊಕ್ಕಟೋನ್ನ ಬೆಳೆ ವೇಸಿನ 1-2 ರೋಜು ತರುವಾತ. ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ರಾವಟಾನಿಕಿ ಮುಂದು ಗೋಧಿ : ಪಂಟ ವೇಸಿನ 20-25 ರೋಜು ತರುವಾತ, ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ರಾವಟಾನಿಕಿ ಮುಂದು. ಪಕ್ಕರೆ: ಮೊಕ್ಕಲು ನಾಟಿನ 6 ವಾರಾಲ ತರುವಾತ ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ರಾವಟಾನಿಕಿ ಮುಂದು, ತರುವಾತ ನಿಟಲೋ ಉಂಡೇ ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು : ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ಚಿನ್ನವಿಗಾ ಉಂಡಿ. ಚುರುಕುಗಾ ಎದುಗುನ್ನ ತರುಣಲಲೋ ಬಂಗಾಳಾದುಂಪ : ಪಂಟ ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ಎದಗಟಾನಿಕಿ ಮುಂದು. ತೇಯಾಕು : ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ಚಿನ್ನವಿಗಾ ಉಂಡಿ ವೇಗಂಗಾ ಎದುಗುತುನ್ನಪುಡು. ಪಂಟ ವೇಯಿನ ಪ್ರಾಂತಂಲೋ : ಪಂಟ ವೇಯಟಾನಿಕಿ ಸಿದ್ದಂ ಚೇಸಿನ ಪೋಲಂಲಲೊ ಮಾತ್ರಮೋ ಚಿಸಿಕಾರೀ ಚೇಯಾಲಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಾಲಿನ ವಿಧಾನ : ಮೋಕ್ಕಲಮೈನ ಹಿಚಿಕಾರೀ ಚೇಯಾಲಿ. ಪರಿಮಿತಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಚಿತಾನಿಕಿ ಜಾಗ್ರತೆಗಲು. ಪೊರುಗು ಪೋಲಾಲಲೋ ಪ್ರತ್ತಿ ಬಿಂಗಾಕಾ, ಪೋಗಾಕು. ಮಿರಪಕಾ, ಟೋಮೆಟೋಲೋ, ದ್ರಾಕ್ಷ, ಬೆಳೆ ವೇಸಿತಯಿತೇ ದಿಸಿರಿ ಉಪಯೋಗಿಚರಾದು. ಈ ಬೆಳೆ ಜಾಲಾ ತೇಲಿಕಲಾ ಪ್ರಭಾವಿತಂ ಆವುತಾಯಿ ತೇನೆಟೀಗಲಕು ಹಾನಿ ಜರಿಗೇ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲಲೋನೂ ದೀನ್ನಿ ಹೀಲ್ಲರಾದು. ಬಟ್ಟ ಚೇತುಲತೋ ಕಲಪರಾದು.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು : 1. ಔಷಧದ ದ್ರಾವಣನನ್ನು ಆಹಾರ ಪಧಾರ್ಥಗಳಿಂದ, ಖಾಳಿಯಾದ, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಶುವಿನ ಗ್ರಾಸದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗತ್ರೆವಹಿಸಬೇಕು. 3. ಔಷಧಿಯನ್ನು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗಾಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 4. ಕಲುಷಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆ, ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಮಲುವುದು ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಔಷಧಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕವಚಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು.

ವಿಷಸ್ಪಭಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ನಿದ್ರಾಣ, ನೆಂಜು, ಆವರ�್‌ಕ್ಷಿಯಾ. ಬೇದಿ. ಮುಖ ಮತ್ತಾ ಆಸ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಣ, ಮಯಸ್ತನಿಯಾ. ಹೃದಯತಿತಿ ನಿರೋಧ, ಹೈಪರ್‌ನಕ್ಕಿಯಾ, ಪರಿಫರಲ್ ನ್ಯೂರಿಟಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಷಗ್ರಸ್ತಸಾದ ಸ್ವತಯಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಒಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿಯಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿರಿ. ಮೊರ್ಭೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಂತಿ ಮಾಡಸಬೇಕು. 2. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದು. 3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಕಿಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ವಿಷ ಬಾಯಾವನ್ನು ಹೀರಿದ ವ್ಯಕಿಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ಕ್ವಿನಿಡೈನ್ ಸಲ್ಫೆಟ್ ಅಂಗಗಳು ಸೆಟೆದು ಕೊಂಡು ಹೊಗುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ವರ ನಿಲ್ಲಲು ರೋಗಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಷಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ ಬೇಕು.

ಸೂಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಬೀಳದಿರುವ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. 2. ಅಪ್ಪಟ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು. ಔಷಧ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ : 1. ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಣಬೇಕು. 2. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. 3. ವಾತಾವರಣ, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ತೊಳೆದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಪಾಯಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ್ಯ.

ರಸಾಯನಿಕ್ ಮಿಶ್ರಣ :

2-4ಡಿ, ಅಮೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಿಕಲ್

(97% ತೂಕ/ತೂಕ ಎ.ಐ. ಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ)	: 59.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸೀಕ್ವೆಸ್ಟರಿಂಗ್ ಎಜೆಂಟ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್	: 30.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಲಿಗ್ನಿನ್ ಸಲ್ಫೊನೆಟ್	: 1.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡೈಲ್ಯುಯಂಟ್	: 10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಮೊತ್ತ	: 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ / ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

2,4-D AMINE SALT 58% S.L. (HERBICIDE)

2,4-D amine salt is a selective herbicide effective against broad leaved weeds in Sorghum. Maize. Wheat, Sugarcane, Potato, Tea & non Cropped areas. It is also effective against some Aquatic weeds.

Recommendation:

Crop	Common name of	a.i. (Kg.)	Dosage per Hectare Formu-lation(litre)	Dilution water (litre)	Witting Period between last spray to harvest (Day)
Sorghum	Cyperus iria, Striga spp. Thianthema spp. Tridax procumbens Digera arvensis Convlvulus arvensis Euphorbia hirta Euphorbia hirta phyllanthus niruri	1.8	3.00	500-600	-
Maize	Trianthema Monogynae, Amaranthus sp. Tribulus terreistris Boerheavia diffusa, Euphorbia hirta, Portuluca oleracea, Cyperus sp.	0.5	0.86	400-500	50-60
Wheat	Chenopodium album, Asphodelus Tenulolius, Fumeria spp. Melotus alba Convolvulus arvensis.	0.5-0.75	0.85-1.30	500-600	-
Sugarcane	Cyperus irir Digitaria spp. Dactyloctenium aegypticum Digera arvensis Porlulaca olieracea Commelina beghalensis Convolvulus Arvensis	3.5	6.0	500	-
Aquati Weeds	Eichhornia crassipes	0.5-1.0	0.85-1.70	600-700	-
Potato	Chenopodium album Asphodelus tenuiifolius Convolvulus arvensis Portulaca oleracea	2.00	3.50	400	-
Tea	Digitaria Sp. Boerhavia hispida	0.8	1.40	500	-
Non Crop Area	Parthenium hysterophorous Cyperus rotundus	2.65 2.5	4.50 4.5	300-400 300	- -

Time of Application : Sorghum : Post emergence, apply when sorghum is 10-30 cm tall. Maize : Pre emergence. 2-3 days after the sowing of crop. Wheat : Post emergence, 30-35 days after sowing of crop. Sugarcane : Pre emergence or Post emergence. 6 weeks after planting cane. Aqautic weeds : When weeds are young & actively growing. Potato : Pre emergence of crop/weed. Tea : When the weeds are young & actively growing. Non Crop Area : Parthenium hysterophorous : When the weeds are young & actively growing. Non crop Area : Spraying should be made in fallow land. Mode of application : Mostly blanket application.

Direction of use : Plant Protection Equipment : Knapsack sprayer, foot sprayer, compression battery sprayer & ASPEE-HTP power sprayer fitted with flat fan or flood jet nozzle. Limitation & Caution for use : Do not spray the crop in neighbourhood of cotton potato, chillies, tomato & grapes as they are very susceptible, Do not use those situations where there is possibility of harming flies. Avoid spray drift. Keep live stock away from spray area for the last two weeks. Do not store need seeds, fertilizer & insecticides. Do not inhale or mix with bare hands.

Precaution : 1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 2. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Nausea, Headache, weakness, diarrhoea, spasticity of muscles of the hands & feet. There may by hyperpyrexia in few cases. Death may accur due to ventricular fibrillation or cardiac arrest.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomit us is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled take th patient in fresh air.

Antidote : Qunidine sulphate may be give to control myotonia or suppress abnormal ventricular cardiacrhyum. Treat symptomatically.

Storage : The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premise spray from se rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate admirals under lock and key responding upon the quantity and nature of the material. The rooms or premises meant for stoning them shall all be well-bulit, dry, well-lit, ventilated and of sufficient detentions.

Disposal of the Containers: The packages shall be broken and burried away from habitation. The used package. shall not be left put side to prevent their re-use. The used packages or surplus material and washings from equipment should be disposed off in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Chemical Composition :

2,4-D Acid Tech. (based on 95% w/w a.i.)	: 59.00% w/w
sequestering agent : Dimethyl amine	: 30.00% w/w
Lignin Sulphonate	: 1.00% w/w
Diluent (Aqua)	: 10.00% w/w
Total	:100.00% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

2, 4- ಡಿ ಅಮೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ 58% ಯಸ್.ಎಲ್. (ಕಲುಪುನಾಶಿನಿ)

ಮೊಕ್ಕಜೊನ್ನ, ಸುಜ್ಜಲು, ಗೌಧುಮ, ದೆರಕು, ಬಂಗಾಳದುಂಪ, ತೆಯಾಕು ಮರಿಯು ಪಂಟ ವೇಯನಿ ಪ್ರಾಂತಾಲಲೆ ವಚ್ಚೆ ವಿಶಾಲಮಿನ ಆಕುಲು ಕಲಿಗಿನ ಕಲುಪುಮೊಕ್ಕಲಕು 2,4-ಡಿ ಅಮೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವವಂತಂಗಾ ಪನಿದೆನ್ನುಂದಿ.

ಸಿಫಾರಸುಲು :

ಪಂಟ	ಕಲುಪುಮೊಕ್ಕ ಶಾಧಾರಣ ಪೆರು	ಮೋತಾದು/ಹೆಕ್ಟಾರ್ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥಂ (ಕಿಲೆ)	ಮುಂದು (ಲಿಟರ್ಲಲೆ)	ಎನ್ನಿಲೆಳ್ಳಲ್ಲೆ (ಲಿಟರ್ಲು)	ಚಿವರಿ ಸ್ಪ್ರೆ ತರುವಾತ ಪಂಟಕೋತಕು ವೆದಿ ಉಂಡವಲಸಿನ ಸಮಯಂ
ಜೊನ್ನ	ಸೈಪ್ರಸ್ ಇರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಿಗಾತಿಗ ಲಿಜಾತಿಮಾ ತಿಗ ಡ್ರೆಡಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಾರಮ ಬೆಂಪ್ ಡಿಚೆರಾ ಆರ್ಬಿನೆಸ್ ಕಚ್‌ವಲ್‌ವುಲಸ್ ಆರವೆನಸಿಸ್ ಯೂಫೊರ್ಬಿಜಾ ಹಿರ್ಟಾ ಫೆಲ್ಲಾಸ್ ನಿರುಡಿ	1.80	3.0	500-600	-
ಮೊಕ್ಕಜೊನ್ನ	ಲಿಜಾತಿಡಾ ಮೊನೊಗ್ರಿನಾ ಅಮರಾನ್ಥಸ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ. ಲಿಬುಲಸ್ ಲೆರೆಸ್ಟ್ರಿಸಾ ಬೌಂಹಿಯಾತಿಪ್ಪಾಸಾ ಯೂಪೊರ್ಬಿಜಾ ಹಿರ್ಟಾ ಪೊರ್ಟಲಾಲೆರೆಡಾ ಲಿಯಾ ಸೈಪ್ರಸ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ.	0.5	0.80	400-500	-
ಗೌಧುಮ	ಚೆನೊಪೊಡಿಯಮ್ ಅಮ್ಯಮ್ ಅಸ್ಫಾಡಿಅಸ್ ಲೆವಿಲಿಯಸ್ ಹಮೊಸಿಯಾ ತಿಗ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ ಮೆಲಿಲೊಅಸ್ ಅಲ್ಬಾ ಕವಲಲವಲಸ್ ಅರವೆನ್ಸಿಸ್	0.5-0.75	0.85-1.30	500-600	-
ಚೆಕಕು	ಸೈಪ್ರಸ್ ಇರಿಯಾ ಡಿಚಲಾರಿಯಾ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಿ. ಡೆತ್ತಿಲೊಕ್ಟೆನಿಯಮ ಎಜಿಪ್ಟಿಕಮ ಡಿಚೆರಾಆರ್ಬಿಜಸಿಸ್ ಪೆರ್ತುಲಂಯಾಕಾ ಏಲೆರಾಸಿಯಾ ಕೊಮೆಲಿನಾ ಬೆಮಾಲೆನಸಿಸ್ ಕನಿವೆಲಲಸ್ ಅರವೆನಸಿಸ್	3.0	6.0	500	-
ವಿಲೆಟ್ ಬಂಗಾಳಾ-	ಇಚೊರ್ಬಿಆ ಕ್ರಿಸಿಯಸ್ ವೆಂಪೊಡಿಯಮ	0.5-1.0	0.8-1.70	600-700	-
ದುಂಪ	ಅಯಬಮ್ ಅಸ್ಫಾಡೆಲಸ್,ಲೆಸುಫಲಿಸ್ ಬೆಮುಫಲಿನ,ಕವಲಿಪ ಅರವೆನಸಿಸ್ ಪೊತ್ಮಲಾಕಾ ಲೆಕಾಸಿಲಾ	2.0	3.5	400	
ಟೆ	ಡಿಚಕಾಕವಾ ಎನ್.ಪಿ ಬೌಹರ್ಬಿಜಾ ಹಿಸ್ಪಿಡಾ	0.8	1.40	500	-
ಸುಲಮೆಯನಿ ಪ್ರಾಂತಂ	ಪೆಕ್ಟೆನಿಯಮ್ ಹಿಸ್ಟೆರೊಫೊರಸ್ ಸೈಪ್ರಸ್ ರೌಂಡಿಸ್	2.65-2.5 2.5	4.50- 4.5	300-400 300-400	- -

ಉಪಯೋಗಿಂಪು ಸಮಯಂ : ಸಜ್ಜಲು : ಈ ಮೊಕ್ಕಲು 10-30 ಸೆಂ.ಮಿ. ಪೊಡಗು ಎಡಿಗಿನ ತರುವಾತ ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ಪಚ್ಚಿನ ತರುವಾತ. ಮೊಕ್ಕಜೊನ್ನ : ಪಂಟ ವೇಸಿನ 2-3 ರೋಜಲ ತರುವಾತ, ಕಲುವುಮೊಕ್ಕಲು ರಾವಟಾನಿಕಿ ಮುಂದು. ಗೌಧುಮ : ಪಂಟ ವೇಸಿನ 30-35 ರೋಜಲ ತರುವಾತ. ಕಲುವುಮೊಕ್ಕಲು ರಾವಟಾನಿಕಿ ಮುಂದು. ಚೆಕಕು : ಮೊಕ್ಕಲು ನಾಟಿನ 6 ವಾರಾಲ ತರುವಾತ, ಕಲುವುಮೊಕ್ಕಲು ರಾವಟಾನಿಕಿ ಮುಂದು, ತರುವಾತ. ನಿಟಿಲೆ ಉಂಡೆ ಕಲುವುಮೊಕ್ಕಲು: ಕಲುವುಮೊಕ್ಕಲು ಚಿನ್ನವಿಗಾ ಉಂಡಿ. ಚುರುಕುಗಾ ಎದುಗುತುನ್ನ ತರುಣಲಲೆ ಬಂಗಾಳದುಂಪ : ಪಂಟ/ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ರಾವಟಾನಿಕಿ ಮುಂದು ತೆಯಾಕು : ಕಲುವು ಮೊಕ್ಕಲು ಚಿನ್ನವಿಗಾ ಉಂಡಿ. ವೇಗಂಗಾ ಎದುಗುತುನ್ನಪ್ಪುಡು. ಪಂಟವೆಯನಿ ಪ್ರಾಂತಂಲೆ : ಪಂಟ ವೆಯಟಾನಿಕಿ ಸಿದ್ಧಂ ಚೆಸಿನ ಪೊಲಂಲೊ ಮಾತ್ರಮೇ ಏಪಿಕಾರಿ ಚೆಯಾಲಿ.

ಉಪಯೋಗಿಂಪುವಿಧಾನ : ಮೊಕ್ಕಲಪೈನ ಏಪಿಕಾರಿ ಚೆಯಾಲಿ.

ಪರಿಮಿತಿ ಮರಿಯು ಉಪಯೋಗಿಂಪಟಾನಿಕಿ ಜಾಗ್ರತ್ತ : ಪೊರುಗು ಪೊಲಾಲಲೆ ಪ್ರತ್ತಿ, ಬಂಗಾಳ, ಪಾಗಾಕು, ಮಿರಪ, ಟಮಾಟ, ದ್ರಾಕ್ಷ, ಪಂಟಲು ವೆಸಿನಟ್ಟಯಿತೆ ದೆನಿ ಉಪಯೋಗಿಂಪರಾದು. ಈ ಪಂಟ ವಾಲಾ ತೆಲಿಕಗಾ ಪ್ರಭಾವಿಂಪ ಅವುತಾಯಿ. ತೆನೆಟೀಗಲಕು ಹಾನಿ ಜರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲಲೆ ದೆನಿ ಉಪಯೋಗಿಂಪರಾದು. ಅಂಂಕುಂಡಾ ಮಾಸುಕೌವಾಲಿ. ಪಶ್ವಾಲಾ ವಿರುವುಲು, ಕೀಟಕನಾಶನುಲಕೆ ಪಾಟುಗಾ ನಿಲ್ವ ಚೆಯರಾದು. ದೆನ್ನಿ ಪೀಲ್ಚರಾದು. ಒಟ್ಟ ವೆಕುಲೆ ಕಲಪರಾದು.

ಮುಂದು ಜಾಗ್ರತ್ತಲು : 1. ಮಂದು ಧ್ರಾವಣಮುನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಮುಲು, ಖಾಳಿ ಪಾತ್ರಲು ಮರಿಯು ಪಶುಗ್ರಸಮುಲಕು ದೂರಮುಗಾ ಉಂಚಂಡಿ. 2. ಮಂದುನು ಮುಖಮು, ಕಳ್ಳು ಮರಿಯು ಚರ್ಮಮುನಕು ಅಂಟಿಸಿಯರಾದು. 3. ಮಂದು ಧ್ರಾವಣಮುನು ಪೀಲ್ಚರಾದು. ಗಾಲಿ ವಾಟಮುಗಾ ಮಂದುನು ಏಪಿಕಾರಿ ಚೆಯವಲೆನು. 4. ಕಲುಷಿತ ದುಸ್ತುಲು ಮರಿಯು ಶರೀರ ಭಾಗಮುಲನು ಏಪಿಕಾರಿ ಕರ್ತ್ರತ ಬಾಗಗಾ ಶುಭ್ರಪರುಚುಕೌನವಲೆನು. 5. ಏಪಿಕಾರಿ ಚೆಯುನಪುಡು ಪೊಗಡ್ರಾಗುಟ, ಡ್ರಾಗುಟ, ತಿನುಟ ಮರಿಯು ಏಡ್ರೆನಾ ನಾಮುಲುಟ ನಂಟಿವಿ ದೆಯರಾದು. 6. ಮಂದು ಧ್ರಾವಣಮುನು ಕಲುಪುನಪುಡು ಮರಿಯು ಏಪಿಕಾರಿ ಚೆಯುನಪುಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ದುಸ್ತುಲನು ಧರಿಂಚವಲೆನು.

ವಿಷಲಕ್ಷಣಾಲು : ಬಲಹೀನತ, ಲೆತ್ತಿ, ಆವೆಕಿಕ್ಕಿಯಾ, ವಿರೆವಲಾಲು, ಕಂಠರಾಲ ನೊಪ್ಪಿ, ಹೃದಯಗತಿನಿರೋಧಂ, ಹೈಪರ್ ವೈವರೆಕ್ಸಿಯಾ. ವೆರಿ ಪ್ರೆರಲ್ ನ್ಯೂರಿಟಿಸ್. ಇವನ್ನು ವಿಷಗ್ರಸ್ತುನಿಲೆ ಕನ್ಪುಸ್ತಾಯಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸ : 1. ಮೆದ ವೆಂಬಕ ವೆಕ್ಕಲಿಗಿಲಿ ಪೆಟ್ಟಿ ವಾಂತಿ ಚೆಯಂಚಂಡಿ. ಮಂದು ಪುಡ್ಡಿಗಾ ಬಯಟಕು ವಚ್ಚೆ ವರುಕು ವಾಂತಿ ಚೆಯಂಚಂಡಿ. 2. ಶರೀರಂ ಪಾ ಪಡಿತೆ, ಧಾರಾಳಂಗಾ ನೀಟಿತೆ ಶುಭ್ರಂ ಚೆಯಾಲಿ. 3. ಮಂದು ಕಳ್ಳಲ್ಲೆ ಪಡಿತೆ 10-15 ಮಿ. ಎಕ್ಕುವ ನೀಟಿತೆ ಕಳ್ಳು ಶುಭ್ರ ಪರಂಪಂಡಿ. 4. ವಿಷ ವಾಯುವುನು ನೀಲ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ. ಧಾರಾಳಂಗಾ ಸ್ವಿಚ್ಛುಮಿನ ಗಾಲಿ ವೀದೆ ಪ್ರದೇಶಾನಿಕಿ ತಿಸುಕು ವೆಳ್ಳಂಡಿ.

ವಿರುಗುಡು : ಕ್ವಿನಿಡೈನ್ ಸಲ್ಫೆಟ್ ಅಂಗಮುಲು ಬಿಗುಸುಕೌನಿ ಪಾವುಟ ಮರಿಯು ಜ್ವರಮು ಆವುಟಕು ರೋಗಿಕಿ ಇವ್ವವಲೆನು. ವಿಷಲಕ್ಷಣಮು ಲನು ಅನುಸರಿಂಚಿ ವಿಕಿತ್ಸ ಚೆಯವಲಯುನು.

ನಿಲವ ಚೆಯುಟಕು : ಕೀಟನಾಶಗಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗುಲನು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಿನ ಗದುಲಲೆ