Hexaconazole 5% SC

(Systemic Fungicide)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

Hexconazole 5% SC is a systemic fungicide used for the control of powdery mildew of mango & Grapes and Sheath blight of rice.

Recommendation :

Crop	Common Name of the Discase	a.i. (gm/%)	Dosage/Ha. Formula-tion (ml)	Dillution in (Ltr)	Waiting Period between last spray to Harvest (days)
Mango	Powdery Mildew	0.01% or 10 g/100 lit Water	0.2% or 200 ml/ 100 lit. water	As required depending on size of tree and plant protection equipment used	27
Rice	Sheath blight	500gm	1000ml	500	40

Direction of use :

a) Preparation of spray mixture : Take the required quantity of Hexaconazole 5% SC dilute with a little as per spray plume required and mix well again string.

b) Plant Protection Equipment : The most commonly used sprayer are Bucket pump sprayer, Rocking sprayer, Foot sprayer, Wheel barrow sprayer, Compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer and ASPEE HTP Power sprayer.

Compatibility : Hexaconazole 5% SC is compatible with the commonly used insecticide and fungicides.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the tody after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Limitations and Cautions for use : Do not use in those situation in there is possibility of harming bees and fish. Live stock, game, wild bird and animals.

Phytotoxicity : Hexaconazole 5% SC is not phytoxic when used as per recommendations. Compatibility : Hexaconazole 5% SC is compatible commonly used insecticides and fungicides.

Symptoms of Poisoning :Nervousness, Anxiety, tremors, convulsions, allergic manifestions may occus.

First Aid : 1. If swallwed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are conanimated. 3. Packages Shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate admirals under lock key depending upon the quantity and the nature of the fungicide. 2. The store rooms should be well lit, well built, ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Chemical Composition :

Hexaconazole technical (Min.purity 92%)	: 5.430% w/w
Propylene glycol	: 5.000% w/w
Emulsifiers A (Blend of polyoxyethlene polyoxypropylene ethers and calcium salt of alkyl)	:3.000% w/w
Emulsifiers B (Amine salt of polyalkyl aryl ether phoshate)	: 3.000% w/w
Emulsifiers C	: 2.500% w/w
Potassium phosphite	: 10.000% w/w
Polysaccharide	: 0.200% w/w
Defoamer	: 0.250% w/w
Distilled /D.M. Water	: 68.120% w/w
Wetting and dispersingh Agent (Sodium salt of Fatty alcohol)	: 2.500% w/w
Total	: 100.000% w/w

హెక్సాకొనజోల్ 5% ఎస్‌సి

అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

హెక్సాకొనజోల్ 5% యస్.సి. అనునది మామిడి మరియు ద్రాక్ష పైర్లనాశించు బూడిదతెగులు మరియు వరిపైరునాశించు పొడతెగులును అరికట్టుటకు ఉపయోగించబడు అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని.

సిఫారసులు :

పైరు	తెగుళ్ళ సాధారణ నామము	మూ.ప. (గ్రా%)	ద్రావణము (మి.లీ.)	హెక్టారుకు మోతాదు నీరు పరిమాణము	చివర పిచికారి నుండి కోతల మధ్య వ్యవధి రోజులలో
మామిడి	బూడిదు తెగుల	0.01% లేక 10గ్రా/100లీ. నీటిలో	0.2%లేక 200మి.లీ/100లీ నీటిలో	మొక్క ఎత్తు మరియు ఉపయోగించు యంత్ర పరికరమును	27
వరి	పొడ తెగులు	50గ్రా	1000 మి.లీ.	500	40

మందు ఉపయోగించుటకు సూచన :

ఎ) మందు మిశ్రమము తయారు చేయు విధానము : హెక్సాకొన్నజోల్ 5% యస్.సి. ని అవసరమైన పరిమాణములో తీసికొని కొద్ది నీటి పరిమాణములో కరిగించి బాగుగా కలపవలెను. తరువాత మిగిలిన నీటిపరిమాణమును కలిపి బాగుగా కలియత్రిప్పవలెను. బి) సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరములు : సాధారణముగా ఉపయోగించు బక్కెట్టు స్ప్రేపంపు, రాక్ స్ప్రేపంపు, తొక్కుడు స్ప్రేపంపు, వీల్‌బ్యారో స్ప్రేపంపు, గాలి ఒత్తిడితో పనిచేయు బ్యాటరీ నాప్‌సాక్ స్ప్రేపంపు, గాలి ఒత్తిడితో పనిచేయు నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేపంపు మరియు ఆస్పీ హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేపంపులను ఉపయోగించవచ్చును.

మందు కలిసే గుణము : హెక్సాకొన్నజోల్ 5% యస్.సి. సాధారణముగా ఉపయోగించు అన్ని కీటకనాశినులు మరియు శిలీంధ్రనాశినులతో కలపి ఉపయోగించవచ్చును.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు, భాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసములను దూరముగా ఉంచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు మందు ద్రావణమును తగుల నీయరాదు. 3. మందు ద్రావణము పీల్చరాదు, గాలి వాటమగునే పిచికారి చేయవలెను. 4. మందు పిచికారి తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. మందు కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు పొగపీల్చుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి.

మందు ఉపయోగించుటకు పరిమితులు మరియు హెచ్చరిక : తేనె టీగలు, చేపల పెంపకము, పశువులు, పక్షులు, ఆటస్థలములకు హాని చేయు పరిస్థితులలో మందును ఉపయోగించరాదు.

విషతుల్యత ÷ దీనిని సిఫారసు చేసిన మోతాదులలో ఉపయోగించినచో విషతుల్యము కాదు.

ముందు జాగ్రత్తలు :

1. తిను బండారములు, భాళీ పాత్రలు మరియు పశువు గ్రాసములకు దూరముగా ఉంచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగులనీయవద్దు. 3. పిచికారి ద్రావణమును పీల్చవద్దు. గాలి వాటముగా పిచికారి చేయవలెను. 4. పిచికారి తర్వాత దుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. పొగత్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట చేయరాదు. 6. ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులు ధరించవలెను.

విషలక్షణములు : నరములు స్వాధీనములో లేకపోవుట, ఉత్కుకత, వణుకు కందరములు స్వాధీనములో లేకుండుట మరియు దద్దుర్లు వంటివి కనబడవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మందును మ్రింగినచో గొంతులోనికి వ్రేళ్ళుజొనిపి వాంతి చేయించవలెను. మ్రింగిన మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంత వరకు మరల మరల వాంతి చేయించవలెను. రోగి స్పృహలో లేనపుడు వాంతి చేయించరాదు. 2. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 3. మందు భాళీగా డబ్బాలు పసులగొట్టి జనావాసములకు దూరముగా పాతిపెట్టవలెను.

మందు నిల్వపద్ధతులు : 1. శిలీంధ్రనాశినులు గల పెట్టెలు వేర్వేరు దులలో ప్రత్యేకముగా ఆహార నిల్వ ఉంచవలెను. గదులకు తాళముచేసి భద్రపరుచు కొనవలెను. 2. మందును నిల్వ ఉంచు గదులు, బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో నిర్మించబడినవిగా, చల్లని, పొడి ప్రదేశములుగా ఉండవలెను.

రసాయనిక మిశ్రమము :

హెక్సాకొనజోల్ టెక్ని (92% స్వచ్ఛతపై ఆధారిత)	: 5.430% భా/భా
ప్రొపిలిన్ గ్లైకొల్	: 5.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ ఎ(బ్లెండ్ ఆఫ్ పాలి ఆక్సిఇథిలిన్ ఈథర్స్) పాలిఆక్సిప్రోపాఇథిలిన్ ఈథర్స్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కిల్ బెంజిన్ గైఫోనెట్)	: 3.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ బి (అమైన్ సాల్ట్ ఆఫ్ పాలి ఆల్కిల్ అరిల్ ఈథర్ ఫాస్ఫేట్,	: 3.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ సి	: 2.500% భా/భా
పొటాషియం ఫాస్ఫైట్	: 10.000% భా/భా
పోలీసైదారైడ్	: 0.200% భా/భా
డిఫోమర్	: 0.250% భా/భా
డిస్టిల్డ్/డి.యం.వాటర్	: 68.120% భా/భా
వెట్టింగ్ మరియు డిస్పర్సింగ్ ఏజంట్ (సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఫాని అల్కహాల్)	: 2.500% భా/భా
మొత్తం	: 100.00% భా/భా

हेक्साकोनाजोल ५% प्रतिशत विलम्वन सान्द्रण

(अर्न्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

चेतावनी : इस लेवल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोई भी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत विलम्वन एस सी एक अंततवाही फफूंदनाशक है । यह आग और अंगूर पर होने वाले चूर्णी आसिता एवं धान के पर्णच्छद अंगमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है।

फसल	रोग के सामान्य नाम	स.तत्व. ग्राम/	मात्रा प्रति हेक्टेयर संरचना प्रतिशत/ प्रतिशत	पानीकी मात्रा मि.ली.	अतिम छिडकाव व कटाई के बीच के अंतराल (दिन)
आम	चूणी आसिता रोग	०.०१ प्रतिशत या १० ग्राम/१०० ली	०.२प्रतिशत या २०० मि.ली/ १०० ली पानी	पेड़ के आकार और स्प्रेयर के अनुसार	२७
धान	पर्णच्छद अंगमारी	५० ग्राम	१००० ली	५००	४०

उपयोग के लिये निर्देश - अ) छिड़काव घोल की तैयारी : हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी की निर्धारित मात्रा को पहले थोड़ा पानी पानी में अच्छी प्रकार मिलायें इसके बाद पानी की आवश्यक मात्रा जो निर्धारित की गयी है मिलायें और छड़ी या छड़ से अच्छी प्रकार मिलायें ।

ब) पौध सुरक्षा यंत्र-हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत वि एस सी का छिड़काव जो सरलता से उपलब्ध छिड़काव यंत्र जैसे-पीठ पर लटकाने वाला, पाँव चालित तथा दबावदार पीठ पर लंकाने वाला छिड़काव यंत्र व दवावदार शक्ति चालित छिड़काव यंत्र पस्पी एच टी पी छिड़काव यंत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है ।

अनुरूपता: हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी आमतौर पर प्रयोग मे आने वाले सभी फफूँदनाशक और कीटनाशक के साथ मिलाया जा सकता है ।

प्रयोग की सीमाएं एवं चेतावनी : अगर मधुमक्खी, मछली, पालतू जानवरों, खेल, जंगली नावरों को हानि की सम्भावना हो, ऐसे स्थान पर छिड़काव न करें ।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस व्दारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें ।

प्रयोग की सीमाएँ एवं चेतावनी : अगर मधुमख्खी, मछली, पालतू जामवरों खेल, जंगली चिड़िया एवं जानवरों के हानि की सम्भावना हो, ऐसी स्थान पर छिड़काव न करें।

पौध विशाक्तता : निदेर्शों के अनुसार प्रयोग करने पर हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी जहरीला नहीं है।

विष के लछण: घबराहट होना, उत्तेजना, केपकंपी, झटके (मिर्गी), एलर्जी की शिकायत हो सकते हैं ।

प्राथमिक चिकित्सा :

१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तव तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें । २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें आर दें और दूषित त्वचा त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइल/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं ।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नही है, लक्षणानुसार इलाज करें ।

खाली डिबों का निपटारा :

१. खाली डिब्बों को तोड़कर इन्हें आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिए । २. खाली डिब्बों का पुना प्रयोग रोकने के लिए इन्हें बाहर मत फेंके ।

३. खाली डिब्बों, बचा हुआ सामान, मशीन की धोवन का निपटारा सावधानी पुवर्क करें जिससे जल या वायु प्रदूषण नहीं ।

संग्रहण की शते : १. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग स्थान या कमरे में उस स्थान या कमरे से दूर संग्रहित करें जहाँ अन्य वस्तुओं खासतौर पर खाद्य पदार्थों या पशु चारे का संग्रहण किया गया हो । अन्यथा इन की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए इनका संग्रहण अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर करें ।

२. संग्रहण का स्थान या कमरा रोशनी से पूर्ण, मजबूत बनावट का, शुष्क,ठंडा तथा हवादार हो । कमरा पर्याप्त लम्बाई-चौड़ाई का होना चाहिए जिससे वायु द्वारा प्रदूषण न हो ।

रासायनिक संरचना :

हैक्साकोनाजोल टेक्नीकल (न्यूनतम शुद्धता ९२ प्रतिशत)	: ५.४३०% भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	: ५.०००% भार/भार
एमल्सिफायरस ए : पोलीओक्सीजाइथिलिन पोलीओक्सी प्रोपाइलिन इथर व एलकाइल बैन्जीन सलफोनेट साल्ट का मिश्रण	: ३.०००% भार/भार
एमल्सिफायरस बी : पोलीअल्काइलं एरिल इथर फास्फेट का एमीन साल्ट	: ३.०००% भार/भार
एमल्सिफायर्स सी	: २.५००% भार/भार
पोटाशियम फोसफाइट	: १०.०००% भार/भार
पोलीसैचाराइड	: ०.२००% भार/भार
डीफोमर	: ०.२५०% भार/भार
डिस्टिल्ड/डि.आम.वाटर	: ६८.१२०% भार/भार
वेट्टिंग आर डिस्पर्सिंग एजेंट :(सोडियम साल्ट आफ फानि अल्कहाल)	: २.५००% भार/भार
कुल	: १००.०००% भार/भार

RACCOLTO®

RACCOTAF +

HEXACONAZOLE 5% SC

Systemic Fungicide

రాకోటాఫ్+

హెక్సాకొనజోల్ 5% ఎస్‌సి

అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశిని

राकोटाफ प्लस

हेक्साकोनाजोल ५ % एससी

(अर्न्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

ఖతరా అపాయము

DANGER

BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

RACCOLTO AGRITECH INDIA PRIVATE LIMITED

13, Maniba Estate, B/H, Kanchan Pharma, Aslali Bypass Road, Aslali-382 427. Dist. Ahmadabad, Gujarat-382 427..

Manufacturer Premises : Shed No 7/1,Ghanshyam Industrial Estate, Sanand- Viramgam Highway, Iyava- Vasana, Sanand -382110, Gujarat

Customer Care No.: 8200006100.

E-mail:contact@raccolto.in

Mfg. Lic. No. : GJ-KHE-01119,. dt. 07/07/2021

Reg.No.:CIR-181833/2021-Hexaconazole (SC) (428)-1653

For Agriculture use.

हेक्झाकोनाझोल ५% एस.सी.

(अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक)

खबरदारी : हया लेबल /हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

हेक्साकोनाझोल ५% एस.सी. हे एक अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक असून त्याचा प्रयोग आंबे आणि द्राक्षाच्या पीकांवरील पिष्टमय बुरशी आणि तांदळाच्या पीकावरील कवच विनाशी (शिथ ब्लाईट)यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो.

शिफारसी :

पीक	रोगाचे सर्व सामान्य नांव	प्रति ए.आय. ग्राम%	हेक्टेयर सुवीकरण मि.ली.%	प्रमाण सौम्यीकरण पाण्यांत (लिटर)	प्रतिक्षा अंवधि शेवटची फवारणी बकटई स्तंत (दिवस)
आंबा	पिष्टमय बुरशी	०.०१ किंवा १० ग्रा/१०० लिटर पाणी	०.२% कींवा २००मि.ली./१०० लिटर पाणी	झाडाचे आकारमान आणि झाड संरक्षक म्हणून वापरलेले साधन यावर अवलंबून	२७
तांदुळ	कवच विनाशी (शिथ ब्लाईट)	५० ग्रा	१००० लिटर	झाडाचे	४०

प्रयोग करण्या संबंधी सुचना : अ) फवारणी साठी मिश्रण तयार करणे: शिफारसीनुसार आवश्य त्या प्रमाणात हेक्साकोनाझोल ५% एस.सी. घेवून त्यांत अगदी थोडे पाणी मिसळा ते एकजीव करा व नंतर त्यांत शिफारस केलेल्या पाण्याच्या प्रमाणातून ऊरलेले पाणी मिसळा व चांगल्या तऱ्हेने ढवळून योग्य असे फवारणी मिश्रण तयार करा. ब) रोप संरक्षक साधने : सर्व सामान्य: वापरली जाणारी साधने आहेत-बकेट (वादली) पंप फवारक, ऊसळणारा पंप फवारक, रॉकींग पंप फवारक, पायाव्दारे चालविण्यांचा फवारक, हाथगाडीचा फवारक, दवाचा नॅपसॅक (पाठी वर लादण्याचा फवारक) दवाचाचा नॅपसॅक बॅटरी संचालीत फवारक आणि ॲरपी एचटीपी शक्ती संचालित फवारक.

अनुकुलता : सर्वसाधारणतः वापरल्या जाणाऱ्या कीटनाशक व बुरशीनाशका बरो बर वापसण्यास हेक्साकोनाझोल ५% एस.सी. हे अनुकुल आहे.

सावधगिरी : १. खाद्यपदार्थ, खाद्यपदार्थांचे रिकामे डबे तसेच पशुखाद्य यां पासून दुर ठेवा. २. मुखडोळे व त्वचा यांच्याशी संसर्ग टाळावा. श्वसनाव्दारे आत जाणार नाही याची काळजी घ्या. वाऱ्याच्या दिशेनेच फवारणी करा. ३. फवारणीचे धुके/तुषार. ४. फवारणी केल्यानं तर दुषित झालेले कपडे तसेच शरीराची विविध अंगे चांगल्या रीतीने स्वच्छ धुवुन टाका. ५. फवारणी करतांना खाणे पिणे चावणे/चघळणे अथवा धुम्रपान करण्या सक्त मनाई आहे. ६. फवारणीचे मिश्रण तयार करतांना आणि फवारणी करतांना संपूर्णपणे सुरक्षित असा पोषाक धारण करावा.

प्रयोगाच्या मर्यादा आणि बाळगावयाची खबरदारी : फवारणी करतेवेळी जर मधमाशा मासे, पशुधन जंगली जनावरे व पक्षी यांना हानी पोहोचणार असेल तर अशावेळी फवारणी करू नये.

वनस्पती विषक्तता : दिलेल्या शिफारसीनुसार जर हेक्साकोनाझोल ५% एस.सी. चा प्रयोग करण्यात आला तर तो वनस्पती विषबाधाकरक होत नाही.

विषयाधेची लक्षणे: जीव घाबरा होणे चिंता, आंचके येणे, स्नायुंची निरंकुश हालचाल, तसेच प्रत्युर्जतेचे प्रकार ऊदमवण्याची शक्यता असते.

प्रथमोपचार :१.जर गिळले गेले असेल तर घशाच्या मागील भागास गुदगुल्या करून रोग्यास ऊलटी करण्यास प्रवृत्त करावे. ऊलटीव्दारा निघणारे द्रव निवळेपर्यंत ही क्रीया वारंवार करीत रहावी रोगी बेशुध्दावस्थेत असेल तर त्याला ऊलटी करण्यास प्रवृत करूनये. २. जर कपडे आणि त्वचा दुषित झाली असले तर दुषित कपडे काढून टाकावेत. संदुषित त्वचा भरपुर पाणी व साबणाने स्वच्छ धुवुन टाकावी. ३. जर डोळे दुषित झाले असतील तर त्यांना भरपूर खाऱ्या/स्वच्छ पाण्याने १० ते १५ मिनीटे पर्यंत धुवावे. ४. जर श्वसनाव्दारे आंत ओढले गेले असेल तर रोग्यास लगेच ताज्या हवेत धेवून जावे.

निवारक प्रतिऊपचार :कोणताहि विशिष्ट निवारक प्रतिऊपचार माहीत नाही. लक्षणांवर आधारित ऊपाययोजना करावी.

वापरूनझालेल्या डब्यांची विल्हेवाट : १. वापरून झालेले रिकासे डब्बे, वापरून ऊरलेले अतिरिक्त पदार्थ आणि बुरशीनाशकाचे मिश्रण बनविण्यासाठी तसेच फवारण्यासाठी वापरलेली साधने यांना धुवुन मिळालेले धोवण यांची विल्हेवाट सुरक्षित पध्दतीने करावी जेणेकरून पर्यावरण आणि पाणी यांच्या प्रदुषणास प्रतिबंध होवु शकेल. २. वापरून झालेल्या रिकाम्या पाकीटांची तोडफोड करून त्यांना रहीवासी वस्ती पासून दुर जमीनीत गाडुन टाकावे.

संग्रहण व्यवस्था :

१. बुरशीनाशकाने भरलेली पाकीटे स्वतंत्र अशा वेगळ्या खोल्यात अगर रतीत, अन्य पदार्थ संग्रहण विषेशतः खाद्यपदार्थ संग्रहण स्थानापाससून दुर असेल अशा ठीकाणी संग्रहित करावीत ही पाकीटे स्वतंत्र अशा वेगळया कपाटांत देखील संग्रहीत केलीजावु शकतात पण अशी व्यावस्था बुरशीनाशकाचा प्रकार आणि त्याचे आकारमान यावर अबलबून राहील.

२. संग्रहणासाठी निवडलेले स्थान हे थंड, शुष्क मजबूत बांधणीचे, भरपुर प्रकाशमय व खेलती हवा असलेले व पुरेशा आकारमानाचे असावे.

रासायनिक संरचना :

हैक्साकोनाजोल टेक्नीकल (न्यूनतम शुद्धता ९२ प्रतिशत)	: ५.४३०% व/व
प्रोपाइर्लीन ग्लाइकोल	: ५.०००% व/व
एमल्सिफायरस ए :पोलीओक्सीप्राइथिलिन पोलीओक्सी प्रोपाइर्लिन इथर व एलकाइल बैन्जीन सलफोनेट साल्ट चे मिश्रण	: ३.०००% व/व
एमल्सिफायरस बी : पोलीअल्काईल एरिल इथर फास्फेट का एमीन साल्ट	: ३.०००% व/व
एमल्सिफायर्स सी	: २.५००% व/व
पोटाशियम फोसफाइट	: १०.०००% व/व
पोलीसैचाराइड	: ०.२००% व/व
डीफोमर	: ०.२५०% व/व
डिस्टिल्ड/डि.आम.वाटर	: ६८.१२०% व/व
वेट्टिंग और डिस्पर्सिंग एजेंट :(सोडियम साल्ट आफ फानि अल्कहाल)	: २.५००% व/व
एकूल	: १००.०००% व/व

हेक्साकोनाजोल 5% एस्सी

(अंतरव्यापि शिलीन्द्र नाशक)

एच्चरिकै : लगत्तिसलाद करडत्रदलियु सूचिसलाद बेळेगळ मेलेयीयं ऊपयोगिसबेकु. इतर बेळेगळ मेलॆ इदन्नु ऊपयोगिसबारदु.')

हेक्साकोनाजोल 5% एस्.सि. अंतरव्यापि शिलीन्द्रनाशकवागिदॆ. मावु बेळॆगॆ हरडुव ऊबदिरोगगळ मत्तु द्राक्षि बेळॆगॆ हरडुव तुरुकु रोगगळ, भत्तुद बेळॆगॆ ऎलॆचुक्कॆरोगगळ इवुगळॆगन्नु हतॊलॆटियल्लिदुत्तुदॆ.

बेळॆगळु	सामन्य रोगॆद ऒरुवु	प्रमाण शक्तुगळॆ ए.ऐ. अथवा %	ग्रा०. (लॆटर्)	करगुऎकॆ सूत्रधारित सुरिनल्लि प्रमाण	कॊनॆय सिंपरणॆ सिंपरणॆयाद नंतर कायबॆकाद समय
मावु	ऊबदि रोगगळु	0.01% अथवा 10 ग्रा०/100 लीटर सुरिगॆ	0.2% अथवा 200 ऎ०ऎल्/ 100 लीटर सुरिगॆ	बॆकाद प्रमाण बॆळॆ बॆळवणिगॆ गात्र, ऎत्तर अथवा सुरिसि	27
भत्तुद	ऎलॆचुक्कॆरोगगळु	0.01% अथवा 10 ग्रा०/100 लीटर सुरिगॆ	0.2% अथवा बॆकाद प्रमाण 200 ऎ०ऎल्/ 100 लीटर सुरिगॆ	बॆकाद प्रमाण बॆळॆ बॆळवणिगॆ गात्र, ऎत्तर अथवा सुरिसि	40
द्राक्षि	तुरुकु रोगगळु	25-50	500-1000	500	14

ऊपयोगिसुव विधान : बॆकाद प्रमाणदल्लि अवश्यकतॆगॆ अनुगुणवागि शिफारसु माडिद हेक्साकोनाजोल् 5%ऎस्.सि. यन्नु कडिमॆ सीरिनल्लि मिश्रण माडि, नंतर अदन्नु बॆकाद प्रमाणक्कॆ सीरॆनन्नु बळसि अदरॊळ्ळु मिश्रण माडुवुदु कॊळ्ळबेकु.

सिंपरणॆ सामग्रिगळु बळसुवॆ : सस्य हागू बॆळॆगळ बॆळवणिगॆ हागू अवुगळॆ ऎत्तरगळन्नुद्दरिसि, स्प्रॆयरॊयन्नु बळसबेकु. तॊऱबनगिरुवि बॆळॆगळगॆ अति हॆच्चिन प्रमाणदल्लि ऒंदरॆ हॆच्चिन वॆगदल्लु सिंपरणॆ मत्तु सीरॆनन्नु बळकॆयु प्रमाणवन्नु निर्धरिसबेकु. सिंपरणॆ माडलु कै पंपु, ब्याटरि पंप्, रूल्ड्रुळॆत पंप्, पवर स्प्रॆयरॊ, ऎन्नु पंपु इत्यादिगळन्नु ऊपयोगिसत्तॆद्दु. बॆळॆगळन्नु ऒद्दरिसि अदॆन्नु बळसदिरुव नाजलॆन्नु बदलिसबेकु, स्प्रिप्पंपुगॆ प्लुग्ॆट्टॆन्नाजलॆ, धूमबिगॆ हत्तिदवागि सिंपरणॆ बॆरॆ नाजलॆन्नु ऒंदॆरॆ समानान्तरवागि बळुव हागॆ सिंपरणॆगळॆ माडबेकु.

ऊॆक्षि मुंजाग्रत :- सिंपरणॆ माडुवुद समयदल्लि दुमबिशान माडुवुदु, शानिगॆन्नु कुडियवुदु, आहार सॆवनॆ माडुवुदु माडबारदु, ऎनादरू अगियुवुदु माडबारदु.ऊॆक्षि बळसिद बट्टिगळन्नु बिट्टि चिन्नाग्रि सीरॆनिंद तॆगॆयबेकु, हागू स्थान माडबेकु. बळसुव आहार पदार्थगळु, पशु आहार पदार्थगळु, हागू ऊपयोगिसुव पात्रॆगळॆगॆ दूरवागि इरिसबेकु. ऊॆक्षि ऋकदतॆ ऎच्चॆरु वहिसबेकु. बायियल्लि, चॆर्मक्कॆ कंब्बुगळॆगॆ ऋकदतॆ ऎच्चॆरुकॆ वहिसबेकु. पिकॆकरि माडुवुदाग ग्रावणवन्नु मुंगागिसिंद मूरसबारदु. नियंत्रण मत्तु ऊपयोगविकॆ:इदन्नु साकु प्राणिगॆळु, साकु पक्षिगळु, पक्षिद्रामा, साकु प्राणिगॆळॆ हत्तिरदल्लि सिंपरणॆ माडबारदु.

अद्ध परिणामगळु: हॆक्साकोनाजोल्ॆन्नु सरियाद प्रमाणदल्लि शिफारसु माडिद प्रमाणवन्नाद्दरिसि सिंपरणॆ यावुदॊंदॆ अद्ध परिणामवमवागुवुदिल्लु. ऎसॆ प्रयोगॆगळ लक्षणगळु : बॆवरु सूरसुविकॆ, मंगकागुविकॆ, कैमुम्बु शॆन्नु, तलॆनोवु, विकारतॆ, वान्तॊयागुव लक्षणगळु, मूरुनंखिंदरॆगळल्लि सॆळॆतॆ.

प्रथमॆ चिकित्सॆ : 1.रोगिगॆ विषॆ प्रयॊग बॆरॆदल्लि गाळियागुवंद प्रदॆशक्कॆ तॆगॆदुकॊंडु होगॆगळॆबेकु. ऊसुरुवाट तॊंदरदॆयागिद्दल्लि कृत्रक ऊसिरुवाववन्नु कॊडबेकु. 2. बायियल्लि ऒंदॆळुगॆगळन्नु हाकॆसि वान्तॊ बरुवंतॆ कक्कॆसबेकु. ॆग्ग्लॆगॆ स्प्रॆऱसिदॆल्लि सीरॆनिंद शुध्दगॊळिसबेकु. दॆहवन्नु नाबाऊसिनिंद चॆन्नाग्रि शुध्दगॊळिसि वॆद्दरॆनन्नु त्रुतिक्कवागि संपर्कॆसबेकु. 3.ऎमिनाशक्कद जॊतॆ बळसुवाग चॆन्नाग्रि सीरॆनल्लि प्रॆशुध्रन माडि कॆड्डि कॊंडॆयिंद मिश्रण रूपदल्लि तरबेकु.

ऊॆक्षि ऊसबाहर : अंतहदॆ ऊॆक्षिधियंतॊन यावुदुदु इल्लु, मॆलॆ तिळिसिद हागॆ माडबेकु.

सिंपरणॆ माडिद तक्कुग तॆगॆदु कॊळ्ळबेकादद जाग्रतॆगळु : 1. स्प्रॆयिंगॆगॆ पूर्णविगादद तक्कुग कै पंपु, अथवा स्प्रॆयरुगळन्नु साबाऊसिनिंद हॆच्चिन सीरॆनन्नु बळसि शुध्दगॊळिसबेकु. 2. ऊॆक्षि बिद्दुंतॆशद चर्मक्कॆ साबाऊसिनिंद चॆन्नाग्रि तॊळॆयियॆ. पात्रॆगळ मॆलॆ बिद्दुळु चॆन्नाग्रि साबाऊसिनिंद शुध्दगॊळिसि, बट्टिगळन्नु प्रतॆ दिन ऒगॆयुवुदु ऒळॆयदु, ऒदलिसुवुदु ऒळॆयदु.

बळसिद डब्बिगळ निर्माणदन्नॆ : 1. प्राकॊट् मत्तु डब्बिगळन्नु निर्जन प्रदॆशदल्लि मंजुन्नु अगॆदु अवुगळन्नु हूरणबेकु. 2. प्लाऱियादद डब्बिगळन्नु मत्तॆ ऊपयोगिसुवुदु सूरुद्दवल्ल. 3.वाताव्रवरणु, सीरु कलुषितवागदंतॆ ऎच्चॆरुकॆ वहिसबेकु. तॊळॆदंतॆ सीरॆनन्नु सह कलुषितवागदंतॆ अदन्नु निष्क्रियगॊळिसुवुदु प्रमुख्य.

सूरुद्द संग्रहणॆ : 1. कीटनाशकगळन्नु बॆळॆगु बीळदिरुव कप्पाटुगळल्लि बीग हाकि इडबेकु. आहार वस्तु ऐंडि मुंतादद वस्तुगळन्नु शॆळियिसुव स्थळदल्लि मक्कळु, बुद्धिहीनरु, साकु प्राणिगळिगॆ सिगुवंतह स्थळदल्लि इडबारदु. 2. अप्पुट कीटनाशकगळन्नु बॆळॆ पात्रॆगळ दॊर्गायिसबारदु. ऊॆक्षद डब्बिगॆ अंटिसिद ऋष्टु माडिरुवद नियमवन्नु ऊॆकॊंड तप्पदॆ पालिसबेकु.

रसायनिक मिश्रण-

हॆक्साकॊनॆजोल्ॆ मूलद प्रदार्थ (92% स्वच्छॆत् ऒदारगॆ)	:5.430% तूरुक/तूरुक
प्रॊपॆपिलॆन् ग्लॆकॊल्ॆ	:5.000% तूरुक/तूरुक
एमल्ॆप्पिफयर्स् ऎ (ऒंडॊण्ड् आफ् प्रापॊलि आक्कि इथिलिन् ईथर्स्)	:3.000% तूरुक/तूरुक
प्रापलिऎक्कि प्रॊऽ्प्रापॊइलिन् ईथर्स् सालर्ट् आफ् अल्कॆर् टॆंऽझॆन् ग्लॆफॊनॆटॆ)	
एमल्ॆप्पिफयर्स्	
बि (अमॆऽन् सालर्ट् प्रापलि अल्कॆर् अरिल् ईथर् फास्ऽॆट्)	:3.000% तूरुक/तूरुक
एमल्ॆप्पिफयर्स् सि	:2.500% तूरुक/तूरुक
पॊटाषियंम् फास्ऽॆट्	:10.000% तूरुक/तूरुक
पॊलिसॆऽॆचारॆऽॆड्	:0.200% तूरुक/तूरुक
डिफॊमॆर्	:0.250% तूरुक/तूरुक
डिऽ्ऽिल्ड्/डि.यॊ.ऎ.वाटर्	: 68.120% तूरुक/तूरुक
वॆऽ्ऽिंगॊण् मत्तु डिऽ्ऽर्प्लिंगॊण् एजॆंट् (सॊडियम् सालर्ट् आफ् फानि अल्कहाल्)	: 2.500% तूरुक/तूरुक
मॊत्तुं	:100.000% तूरुक/तूरुक

ஹெக்சகோனசோல் 5% எஸ்சி

(சிஸ்டமிக் பூஞ்சை கொல்லி)

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும்.
பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

ஹெக்சகோனசோல் 5% எஸ்.சி. ஏரு சிஸ்டமிக் பூஞ்சை கொல்லி மாங்காய், திராட்டையில் ஏற்டும் சாம்பல் நோய் மற்றும் நெல்லை தாக்கும் இலையுறைக்கருகல் நோயை கட்டுப்படுத்துதிறது.

பரிந்துரை :

பயிர்	நோயின் பொதுப் பெயர்	ஏ.ஐ. (கி/%)	ஊட்டுஅளவு/ஹெ சூத்திர மாக்கல்	நீர்த்தல் (லி)	கால இடைவெளி கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை
மாங்காய்	சாம்பல் நோய்	0.01%(அ) 10கி/100லி-நீரில்	0.2%(அ) 200மி.லி/ 100லி-நீரில்	மர அளவு, பயன்படுத்தும் தாவரப்பாதுகாப்பும் சாதனத்தை பொருத்து	27
நெல்	இலையுறை நோய்	50கி/	1000லி	40	

பயன்படுத்தும் முறை :

1. கலவை தயாரிக்கும் முறை : தேவையான அளவு ஹெக்ச கோனசோல் 5% எஸ்.சி. எடுத்து குறைந்த நீரில் கரைத்து, மிகமுள்ள நீரினை கலந்து மற்றும் கபினமாக கலக்கவும். நீரில் கரைது, மிதமுள்ள நீரினை கலந்து மற்றும் கபினமாக கலக்கவும். 2. காவரப் பாதுகாப்பிச் சாதனம் : பக்கெட் பம்பு கெளிப்பான், ஏரவு தெளிப்பான், கால்மித் தெளிப்பான், கைவண்டி தெளிப்பான், அமுத்த நாப்சாக் தெளிப்பான், மின்கல அமுத்த நாப்சாக் தெளிப்பான் மற்றும் ஏரஸப்பிரசு-எச்டிபி மின்சார தெளிப்பான்.

ஏத்தியிரிப்பூ : ஹெக்சகோன சோவ் 5% எஸ்சி. அனைத்து பூஞ்சை கொல்லி மற்றும் பூச்சிக் கொல்லியுடன் லுத்தியில்பு உடையது.

முனாச்சரிக்கை :

1. மணித மற்றும் விலங்குகளின் உணவுப் பொருட்களுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2. வாய், கண் மற்றும் கோலில் படுதுலை கவிர்க்க. 3. தெளிக்கும் போது மருந்தின் துளிகளை சுவாச்த்துதலை தவிர்க்க காற்று தினசயில் தெளிக்கவும். 4. மாசுபட்ட துணிகள் மற்றும் உடமைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும். 5. புகைக்கவோ, குபிக்கவோ, உண்ணவோ மற்றும் மெல்லவோ கூடாது மருந்து தெனிக்கும் போது. 6. பாதுகாப்பான உடைகளை பயன்படுத்தவும் தெளிக்கும் மற்றும் கலக்கும் போது.

முன்எச்சரிக்கை மற்றும் பயன்படுத்தும் வறிமுறை : தேன்க்கள், மின்கள், கால்நடைகள், காட்டு விலங்டுகள் மற்றும் பறவைகள் உள்ளப் பகுதியில் பயன்படுத்தலை தவர்க்கவும்.

பைட்டோ டாக்லிட்டி(தாவர விஷத் தன்மை) : ஹெக்சகோன சோல் 5% எஸ்.சி. விஷத் தன்மையற்றது, பிரந்துரையின் படி.

விஷ அரிகுறிகள் : நரம்புதளர்ச்சி, கலக்க மனநிலை, நடுக்கம், அலர்சி.

முதலுதவி : 1. விழுங்கப்பட்டியிருந்தவ் வாந்த் ஏற்படுதுலை துண்டவும், மருந்து, எவளியேறும் வரை. சுயநினவுயற்ற நோயாளியை வாந்து ஏற்படுதலை துண்ட கூடாது. 2. மாசுபட்ட துணிமற்றும் தோலினை நன்நாது கழுவ கழுவ வேண்டும்.

பாதுகாக்கும் முறை:

1. கனியறையில், உணவுப் பொருட்களுரக்குப் அப்பால், பூட்டி திறக்டும் வகையில் மருந்தினை பாதுகாக்க வேண்டும். 2. இதற்கென தனியாக நன்றாக கட்டப்பட்ட அறை, வறட்சி காற்றோட்டம் மற்றும் தேவையான இட்டும் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

அழிக்கும் முறை :

1. பயன்படுக்கிய காலி டப்பாவை நசுக்கி, எக்கப்பிட்ட இடத்தில் புதைக்க வேண்டும்.

2. பயன்படுத்திய காலி டப்பாவை வெளியே ஏறிகல் கூடாது.

3. நீர் மாசினை கட்டுப்படுக்க மீதமுள்ள மருந்து மற்றும் தெளிக்கும் இயந்விம் குழுவிய நீரினை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

மூலக்கூறு :

ஹெக்சகோனசோல் டெக் (92% எ/எ குறைந்தது கூய்மை)	: 5.430% எ/எ
குழம்பாக்கி : புரேப்டைலன் கிளைக்கால்	: 5.000% எ/எ
குட்டம்பாக்கி ஏ(பிளன்ட் ஆப் பாலிஆக்ஸி எத்திலின்)	: 3.000% எ/எ
ஈத்தர்ஸ் ஆண்ட் காய்சியவ் சால்ட் ஆப் அல்கைல் குழம்பாக்கி பி (அமைன் சால்ட் ஆப் பாலிஅய்கைல் அரைல் ஈத்தர் பாஸ்பேட்)	: 3.000% எ/எ
குடிம்பாக்கி சி)	: 2.500% எ/எ
பொட்டாசியம் பாஸ்னபட்	: 10.000% எ/எ
நுரைதடுப்பான்	: 0.200% எ/எ
ஆவிநீர்	: 0.250% எ/எ
நனை மற்றும் சிதறச் செய்யும் பொருள்	: 68.120% எ/எ
செயலி (சோடியம் சாலிட் ஆப் பேசி ஆலிகஹால்)	: 2.500% எ/எ
மொத்தம்	: 100.0% எ/எ

Hexaconazole 5% SC

(سسٹمک فنگسائڈ)

احتیاط: "اس لیبل/کتابچے پر بتائی گئی فصلوں کے علاوہ دیگر فصلوں پر ایک سیسٹیمیٹک فنگسائڈ Hexconazole 5% SC استعمال نہ کیا جائے".
ہے جو آم اور انگور کے پاؤڈر پھپھوندی اور چاول کے شیتھ بلائیٹ کے کنٹرول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

Recommendation :

Crop	Common Name of the Discase	a.i. (gm/%)	Dosage/Ha. Formula-tion (ml)	Dillution in (Ltr)	Waiting Period between last spray to Harvest (days)
Mango	Powdery Mildew	0.01% or 10 g/100 lit Water	0.2% 200 ml/ 100 lit. water	As required depending on size of tree and plant protection equipment used	27
Rice	Sheath blight	500gm	1000ml	500	40

اسپرے مکسچر کی تیاری: مطلوبہ مقدار میں (استعمال کی ہدایت:
Hexaconazole 5% SC پتلا لیں اور اسپرے کے پلم کے مطابق تھوڑا سا
پودوں کے تحفظ کا سامان: سب سے (ملا کر دوبارہ اچھی طرح مکس کریں۔
زیادہ استعمال ہونے والے اسپریئر میں بالٹی پمپ اسپریئر، راکنگ اسپریئر، فٹ
اسپریئر، ویل بیرو اسپریئر، کمپریشن نیپ سیک اسپریئر، کمپریشن نیپ سیک
پاور اسپریئر ہیں۔ مطابقت: ASPEE HTP بیٹری اسپریئر اور
Hexaconazole 5% SC عام طور پر استعمال ہونے والی کیڑے مار دوا
اور فنگسائڈز کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ احتیاط: ١. کھانے پینے کی چیزوں،
کھانے کے خالی ڈبوں اور جانوروں کے کھانے سے دور رہیں۔ ٢. منہ،
آنکھوں اور جلد کے ساتھ رابطے سے بچیں۔ ٣. سپرے دھند کو سانس لینے
سے گریز کریں۔ ہوا کی سمت میں سپرے کریں۔ ٤. چھڑکنے کے بعد آلودہ
کپڑوں اور توڈی کے حصوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ٥. چھڑکتے وقت تمباکو
نوشی، پینے، کھائیں اور کچھ بھی چبائیں نہ۔ ٦. اختلاط اور اسپرے کرتے وقت
مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔ استعمال کے لیے پابندیاں اور احتیاطیں: شہد کی
مکھیوں اور مچھلیوں کو نقصان پہنچانے کا امکان ہونے کی صورت میں
استعمال نہ کریں۔ لائیو اسٹاک، گیم، جنگلی پرندے اور جانور۔
Phytotoxicity: Hexaconazole 5% SC جب سفارشات کے مطابق
Hexaconazole 5% SC استعمال کیا جائے تو فائٹوکسک نہیں ہے۔ مطابقت:
بم آئینگ عام طور پر استعمال ہونے والی کیڑے مار دوائیں اور فنگسائڈس
ہیں۔ زہر کی علامات: گھبراہٹ، اضطراب، کپکپاہٹ، اکتسپیٹ، الرجی کے
اظہارات ہوسکتے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد: ١. اگر نگل جائے تو گلے کے
پچھلے حصے میں گدگدی کرکے قے کریں۔ اس کو دہرائیں جب تک کہ قے
صاف نہ ہوجائے۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو قے نہ کریں۔ ٢. اگر لباس اور
جلد ناپاک ہیں۔ ٣. پیکجوں کو توڑا جائے گا اور رباش سے دور دفن کیا جائے
گا۔ ذخیرہ کرنے کی شرائط: ١. فنگسائڈز پر مشتمل پیکجوں کو کمرے یا
احاطے سے دور الگ کمرے یا احاطے میں ذخیرہ کیا جانا چاہئے جو دیگر
اشیاء خاص طور پر کھانے کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے لئے استعمال ہوتے
ہیں یا مقدار اور نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ایڈمرلز میں لاک کلید کے
نیچے رکھا جانا چاہئے۔ فنگسائڈ. ٢. سٹور روم اچھی طرح سے روشن، اچھی
طرح سے بنے، ہوادار اور کافی سائز کے ہونے چاہئیں۔ اسٹور کے حالات
خشک اور ٹھنڈے ہونے چاہئیں۔

Chemical Composition :

Hexaconazole technical (Min.purity 92%)	: 5.430% w/w
Propylene glycol	: 5.000% w/w
Emulsifiers A (Blend of polyoxyethlene polyoxypropylene ethers and calcium salt of alkyl)	:3.000% w/w
Emulsifiers B (Amine salt of polyalkyl aryl ether phoshate)	: 3.000% w/w
Emulsifiers C	: 2.500% w/w
Potassium phosphite	: 10.000% w/w
Polysaccharide	: 0.200% w/w
Defoamer	: 0.250% w/w
Distilled /D.M. Water	: 68.120% w/w
Wetting and dispersingh Agent (Sodium salt of Fatty alcohol)	: 2.500% w/w
Total	: 100.000% w/w