

(Plant Growth Regulator)

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gram)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water (Litre)	Waiting period between last spray to harvest (Days)
Grape	Pre-bloom-elongation	40	50	500	-
	Fruit setting-thinning	40	50	500	-
	6-7 mm berry size enlargement	40	50	500	-
Rice	20-25 days after transplanting	20-25	50-62.5	500	-
	At panicle emergence	20-25	50-62.5	500	-

Gibberellic acid a.i.	40.00 % w/w
Polysorbate 20	01.50% w/w
Polyvinylpyrrolidone Agrimer 30	01.00% w/w
Lactose	Q.S.-%
Total	100.000% w/w

(છોડ વૃદ્ધનિયમનકાર)

વપરાય. ભલામણ :

પાક(ઓ) સામાન્ય નામ જંબુ ના	અબ (ગ્રામ)	ડોઝ/હેક્ટર મેન્ટ્રા રાઈ જોવાનો સામગ્રગાળો છેલ્લા વચ્ચે પાણીમાં રચના (લિટર) લણણી માટે સ્પે (દિવસો)
દ્રાક્ષ પૂર્વ-મોર-વિસ્તરણ	40	500
છળ-પાળાના 6-7	40	500
મીમાં બેરીસાઇઝ વિસ્તરણ	40	500
ચોખ્ખા 20-25 દિવસ પછી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન	20-25	500
એટીપેનિડલ ઉદભવ	20-25	500

રાસાયણિક રચના :	
નિબેરેલિક એસિડ એ. આઇ.	40.00% Sમલુ / Sમલુ
પોલિસોર્બેટ 20	01.50% Sમલુ / Sમલુ
પોલિવિનિલપાયરોલિડોન એટ્રીમર 30	01.00% Sમલુ / Sમલુ
લેક્ટોઝ	ધૂ. એસ. %
કુલ	100. 00% Sમલુ / Sમલુ

(మొక్కల అభివృద్ధి నియంత్రణ)

[illegible]

Figure 1

चेतावनी : इस लेबल हस्तपत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य कोई भी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।