

माइक्लोबूटानिल 10 प्रतिशत धुलनशील पाउडर

(अंतप्रवाही फफूटीनाशक)

यह एक अन्तप्रवाही फफूट नाशक जिसमें माइक्लोबूटानिल सक्रिय तत्व है। यह एक असरदार पानी में धुलने वाला संरचना है जो महत्वपूर्ण रोग जैसे अंगुर का चूर्णी फंफूट, सेब का पामा तथा मिर्ची के पर्ण दाग चूर्णी फंफूट व पछाधात(डाय बैक) की रोकथाम के लिये किया जाता है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्रा. या प्रतिशत)	संरचना (ग्रा. या प्रतिशत)			
अंगूर	चुर्णी फंफूट	0.004	0.04	500	15	
मिर्ची	चुर्णी फंफूट, पर्ण दाग, पछाधात(डाय बैक).	0.004	0.04	500	3	
सेब	पामा	0.004	0.04	10 लीटर/ पेंड	21	

उपयोग के लिए निर्देश

हाथ से चलाने वाला जो पीठ पर लटकाया जा सके छिड़काव यंत्र जिसमें खोखला कोन नोजल लगा हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां

- खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्टन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
- मुँह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें।
- छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
- छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
- छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
- छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण

जी मिचलाना, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और साँस की नलियों में खुजलाहट हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा

- यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बैहोश हो तो उल्टी न करायें।
- यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाये तो कपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
- यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग 10-15 मिनट तक धोएं।
- यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विष नाशक

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा

1. निर्माताओं उपयोगकर्ताओं का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाढ़ दें।
2. प्रयोग किये हुए डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर न छोड़ें।
3. डिब्बों या बची सामग्री या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि आसपास की चीजें, पानी प्रदूषित न हों।

संग्रहण की शर्तें

1. फफूंदनाशक के पैकेट के अलग अलग कमरों में या खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरे से दूर अलग जगह पर या आलमारियों में दवा के प्रमाण के एंव प्रकार के हिसाब से ताला चाबी में अलग अलग रखें।
2. जिस कमरे या जगह में फफूंदनाशक का भण्डारण करना हो लह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये।

रासायनिक संरचना :

माइकलोबूटानिल सं तं	10.00 % भार/भार
सिलिका	11.30 % भार/भार
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	6.00 % भार/भार
एलकाइल नेफथालीन सल्फोनेट ॲफ सोडियम	2.00 % भार/भार
क्ले	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग : १००.००० % भार/भार	

निर्माता

अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार

उत्पादन परिसर:

अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

Myclobutanol 10 % WP**(Systemic Fungicide)**

It is a systemic fungicide containing Myclobutanol active ingredients. It is effective wettable powder formulation economically controlling important diseases powdery mildew on Grapes, scab of Apple and Powdery mildew, Leaf spot, die back of Chillies.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water Ltrs	Waiting Period between last spray to harvest spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm or %)	Formulation (gm or %)			
Grape	Powdery mildew	0.004	0.04	500	15	
Chillies	Powdery mildew, Leaf spot, Die Back	0.004	0.04	500	3	
Apples	Scab	0.004	0.04	10 lit/ Tree	21	

Direction of Use

Hand operated knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle is recommended, Gattor, rocking, sprayer can also be used.

Precaution

1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning

Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, irritation to bronchii and lungs tissues may occur.

First Aid

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote

No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

Disposal Of Used Container

1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of product and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine the container shall be disposed off in safe manner. so as to prevent environmental and water pollution. The packages shall be not left to prevent their re-use. packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly article or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises means for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Myclobutanil a.i.	10.00 % w/w
Silica	11.30 % w/w
Sodium Lignosulfonate	6.00 % w/w
Alkyl Naphthalene Sulfonate of sodium	2.00 % w/w
Clay	QS % w/w
Total: 100.000% w/w	

Manufactured By:

RACCOLTO AGRITECH INDIA PRIVATE LIMITED
13, Maniba Estate, B/H Kanchan Pharma, Aslali Bypass Road,
Aslali

Ahmedabad, Ahemdabad, Gujarat 382427

Manufacturer Premises :

Block No. 325/2, Near Gharka Dhaba, NH 8, Village Kanera,
Tehsil and District Kheda 387540 Gujarat

Caution:“Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet”.