

ટેબ્યુકોનાଲ 6.7% + કેપ્ટન 26.9% W/W SC

પ્રણાલીગત ફૂગનાશક

Tebuconazole 6.7% + Captan 26.9% w/w SC એ સપ્તેશન માં હતા જે જોમાં કૌઈનિશનમાં Tebuconazole 6.7% (a.i) + Captan 26.9% (a.i) હોય છે. તેનો ઉપયોગ પાવડર માઈલ્ડ્યુના નિર્વેશન માટે થાય છે. ઓપ વાવ અછરનેડિયા લીફ સ્પોટ/અફરોન અને સ્કેવ. મર્યાં વાવ પાવડર માઈલ્ડ્યુ અને એન્થ્રેકનોસ, સામાન્યના માછવીઉઠર જીનવરઉઠર થાય છે ત્યાં તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. રોલવપત્તી: 1. લેવપ અને પાંકડાઓ વાવ દશાવેલ સામાન્ય પાલ વાવ ઉપયોગ કરવો નહીં. 2. હાવેર પછીનો અછર માટે ઉપયોગ ન કરવો. 3. પત્રિકા નિર્દેશન મુજબ ઉપયોગ કરવો પાંચ કંઠેરનનો નાશ કરો.

Crop(s)	Common Name of Pest	Desage/HA		Dilution in Water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application in (Hours)
		AI (Gram)	Formulation (ml)			
Chilli	Powdery mildew and Anthracnose	80-320	1000	500 L	5	-
Apple	Powdery mildew/Alternaria leaf spot/light	124-496	1550	10 Litree	10	-
	Scab	(0.02% + 0.08%)	(0.25% or 2.5 ml)	10 Litree	10	-

પાણ્યની દ્રષ્ટિ : આર. મિશ્રણ રાસાયણ ટ્યૂબીનાંથી 6.7% + કંટૅન 26.9% *અલ્યુમિનયમ* *સી* સી જ-૧૧૨ જેથી પાછોનાં ભેળવવાને અને સ્પેડીનાંથી *500* *l*/m સાથે ઓલો કોન નોન-ગ્રાઇ સાથે ફીટ કરાવે નેપરક્ટ સ્પેયર ટૂટ સ્પેયરનો ઉપયોગ કરી સેવવાની જરૂર છે. એપા માટે મરજ અને *10* *l*/ટી. અરુઝ કરવાની સમય : પદ્મવતીનાં લવાગાન શિથિ અને તેલનાં દવાગાનાં આધારે નિવાર રીતે લવા કરવું અને 15 દિવસની અંતરે પુનરાવરણ કરવું. ઓયિક્કિનાં તત્વીનીઃ નેપરક્ટ સ્પેયર ટૂટ સ્પેયરની મદદથી પદ્મસાગરનો ઉપયોગ મિશ્રણ માટે સુગતાઃ એક વિમત્ત વાતે ભવાષય પદ્મ પાણીનાં જથ્થામાં ટ્યૂબીનાંથી 6.7% + કંટૅન 26.9% *ww* *સી* નો ભવાષય સ્પેડ માત્રાને રાખી રીતે મિશ્કિત કરો. અરુઝ માટેની તાલ્કાઃ વાસપતિની તબક્કી અને તેલનાં દવાગા સાથે, વાતે પ્રોડેક્શન મરિજમખેન્ટેઃ ઓલો કોન નોન-ગ્રાઇ સાથે ફીટ કરાવે નેપરક્ટ સ્પેયર ટૂટ સ્પેયર નોન-ગ્રાઇનાં પ્રકાર ઓલો કોન નોન-ગ્રાઇ લવાગાન પરિશિષ્ટીઓઃ પવનની સિલિંગમાં ઇન્ટરાઇ કરવાની માટે હોલકી બી ભાર જોખન. અરુઝ કરવાની સમય : શિથિઓઃ ઇન્ટરાઇ દરમિયાન ચોચ માત્રાને સાચવી નહેલો, કરીથી ઉપયોગ કરતા પહેલાં કાડવને પોલો બે અને સોભાળ્યા પછી ચોચ મોજા જોચી દ્રશ્યમાનક કરવાં પહેલો. રાસાયણિક પ્રતિરોધક ટૂટ. રાસાયણિક ગોળય અપાવે માત્રાની યસમા માત્રા પાવન ફૂંકાતાં શિથિમાં જરૂર છે. માત્ર નીની સામે નીચી શરીર પર સેટિંગ નહીં જઈ અટકાવીને ફાટી. ઇન્ટરાઇ કરતી વખતે પાવન ચાલુ, ચાલુવ ચાલવા સુધારાનું પાવન નહીં અથવા ખોરાડને સંભાળવો નહીં. ત્વચા અને આંખો સાથે સંપર્ક ટાળો. ઝેરનાં વલ્લણોઃ નમ્બાઇ, વાડ, માસોની તલ્લી, અસ્યટ ટ્રાઇ આંખોમાં ખબતરા. ત્વચા અને ઉપવાં મારવાનં ત્વચાની પોચા સેન્ટરશિયલ ડ્રાઇ, ઉપરી અને નેકસ્ટર ડ્રાઇ. પ્રાથમિક સારવારઃ 1. જો ઇ-જેટ કરવામાં આવે તો જો વલ્કિત સામન અને નેકસ્ટર ડ્રાઇ, તો પાણીથી મો પોઈ નાનું અને પીવા માટે 1 કેડે ચાલવે પાવન ચાલુ, બેભાન વલ્કિતને કાચી મોઈ કંઈ આંખો, ડોક્ટરને બોલાવો. ફાટી આંખમાં વલ્કિસક ટ્રાઇ ઇન્ટ્રન ન થાય ત્યાં સુધી અને ત્યાં સુધી ઉપરી પેટાઈને હાથોની 2. જો માસ લેવામાં આવે તોઃ દહીંનાં તુલો હવામાં પોઈ જોખો અને શરીરનાં તાપમાનનું ય્યાન રાખો. જો દદ્દાં માસ ન હોય અથવા માસ લેવામાં પોઈને લેવો તો ડ્રિમ્મ માસ સંચયનાંને પ્રધાન-માસોઃ શરીરમાં માસ સાથે આંખો, વલ્કિસકની સલાહ લો. 3. ત્વચાનાં મારવાનાં કિસામાંઃ મોઈનાં અસરકારક માનને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી સારી રીતે ધોવો. જોમાં વાવ અને નખની નીનીનાં સમાવરો થાય છે. જો પીડા લવાશ અથવા ખબતરા ચાલુ રહે છે. ડોક્ટરની સલાહ લો. બપાં ફીટ કરાવે કાચ અગર-ગાંધી ઘાટ જોઈએ અને ઉપયોગ કરતા પહેલાં સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવો જોઈએ. આંખોનાં સંપર્કનાં કિસામાંઃ ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી પુષ્કળ પાણીથી ડાળાં હાથે કોળગા કરો. જો પીડા ખબતરા, લવાશ અથવા ફીટોહીમિયા ચાલુ રહે છે. આંખનાં નિષ્કાતનાં સલાહ લો. ફાયટોટોક્સિક નીનીઃ ભવાષય પ્રમુખ ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે ઉપચાન ફાયટોટોક્સિક નીની. મારણઃ કોઈ વિશિષ્ટ મારણ ટૂટ નથી. વપરાયેલ ફ્લેન્ટરને લવાશકાત રીતે નિવાય. પાવની ફ્લેન્ટરનો નિકાસઃ 1. પેજીને તોલને વવાશકી ટૂટ દુનાવવામાં આચરો. 2. વપરાયેલ પેજીને રીસને રીસના પુન-ઉપયોગને રોકવા માટે બહાર કોડવામાં આચરો નહીં. 3. ફ્લેન્ટરશાળી વવાશય પેજીઓ, વવાશનાં સમયો અને ધોવાનો નિયમ સુરક્ષિત રીતે કરવો જોઈએ જેથી વાંદવચીથી અથવા જળ પ્રદુષ્ણને અટકાવી શકાય. પાવની ફ્લેન્ટરનો રીસોથી ઉપયોગ કરો જોખમી છે. સંક્રમ્ણની સિલિંગોઃ ફ્લુનાપાક પરવાતે પેજીઓ બંધ ઓલો જોઈએ. અને વસ્તુઓ ખાસ કરીને વાવ પીંચીનાં સેક્રે મોટાં પોચોનાં લેવાતો ઓયોહાઈ અથવા જયઓહાઈ દ્ર અથવા સ્મ અથવા પેરિસમાં સંક્રમિત કરવામાં આવે. જો માત્ર મુખ ફ્લેન્ટરમાં કંડી સારી વેન્ટિલેટ્ડ જગ્યાએ રાખો. બાવકોની પહોણી દર રાખો પેરિસકાલ રચનાઃ

Tebuconazole a.i.	6.7 % w/w
Captan a.i.	26.9 % w/w
Polyaryl phenyl ether phosphate	2.1 % w/w
Sodium Naphthalene formaldehyde condensate	1.00 % w/w
Modified-dimethyl polysiloxane	0.6 % w/w
Propylene glycol	5.9 % w/w
Xanthan gum	0.25 % w/w
Water	Q.S. %
Total:	100.000% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ടെബുലോണസോൾ 6.7% + ക്യാപ്റ്റൻ 26.9% W/W SC

പുവസ്ഥാപരമായ കുമിശ്നാശിനി

[illegible]

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (L/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (Hours)
		AI (g)	Formulation (ml)			
Chilli	Powdery mildew and Anthracnose	80-120	1000	500 L	5	-
Apple	Powdery mildew Alternaria leaf spot/blight	124-496	1550	10 L/tree	10	-
	Scab	(0.02% + 0.08%)	(0.25% or 2.5 ml)	10 L/tree	10	-

[illegible]

Tebuconazole a.i.	6.7 % w/w
Captan a.i.	26.9 % w/w
Polyaryl phenyl ether phosphate	2.1 % w/w
Sodium Naphthalene formaldehyde condensate	1.00 % w/w
Modified-dimethyl polysiloxane	0.6 % w/w
Propylene glycol	5.9 % w/w
Xanthan gum	0.25 % w/w
Water	Q. S. %
Total:	100.000% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ಟೆಬುಕೋನಜೋಲ್ 6.7% + ಕ್ಯಾಪ್ಸನ್ 26.9% W/W SC

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

[illegible]

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (L/ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (in Hours)
		AI (Gram)	Formulation (ml)			
Chilli	Powdery mildew and Anthracnose	60-200	1000	500 L	5	-
Apple	Powdery mildew Alternaria leaf-spightburn	124-496	1550	10 L/tree	10	-
	Scab	(0.02% + 0.08%)	(0.25% or 2.5 ml)	10 L/tree	10	-

[illegible]

Tebuconazole a.i.	6.7 % w/w
Captan a.i.	26.9 % w/w
Polyaryl phenyl ether phosphate	2.1 % w/w
Sodium Naphthalene formaldehyde condensate	1.00 % w/w
Modified-dimethyl polysiloxane	0.6 % w/w
Propylene glycol	5.9 % w/w
Xanthan gum	0.25 % w/w
Water	Q.S. %
Total:	100.000% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

W/W SO₂ ۶,۷٪ + کیپٹن ۲۶,۹٪

بیشتر می‌تواند

[illegible]

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (L/ha)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (Hours)
		AI (g/l)	Formulation (ml)			
Chilli	Powdery mildew and Anthracnose	80-320	1000	500 L	5	
Apple	Powdery mildew Alternaria leaf spot/blight	124-496	1550	10 Litree	10	
	Scab	(0.02% + 0.08%)	(0.25% or 2.5 ml)	10 Litree	10	

Ww SC کی استعمال میں کسی مسئلہ: ایسی مکینکلی ٹیوکر کا 70% کا پائپن 20% مطلوبہ مقدار کو میں گیلن کر اسیر کے لیے ضرورت ہے اور اسیر پر والیو ۰۰۰L/h کے ساتھ کوکھلی کی ٹولز سے لین سیر سیکر سے تھر سے کرے۔ استعمال کرنے سے پھر اسے جاتے۔ مز ۱۰ لیٹر ڈرائٹ ایل کے لیے۔ خرواس کا وقت: احتیاطی طور پر لگو گا جاتے اور موجودہ مواد حالت اور بیماری کے بنو کے طے ۵ دن کے وقفے سے دیا جائے۔ ایلی گیش کی تکفیک: کوکھلی سیر سے تھر اسیر میں سے فوئیلر ایل سیکسٹن گن کے لیے: بدایت: کوکھلی سیر 70% کوٹ سے زخمی کے زخمی کے لیے تجویز کرنے کے لیے جسم میں 26.9% Ww SC Captan ایل طرح میں کریں۔ خرواس کا مرحلہ: پودوں کا مرحلہ اور بیماری کے خلائر سے کے وقت۔ پودوں کے تحفظ کا سامان: کوکھلی خرواسی ٹولز سے لین سیر سیکر اثرات سے زخمی کے فہم: کوکھلی خرواسی ٹولز، موسمی حالات: ہوا کے موسم میں سیر نہ کریں۔ مٹی: ہلکی سے بھاری مٹی، خرواس کا وقت: احتیاط: چھڑکے کے دوران مناسب سائیں کے آلات کو دھوئے اور تھر سے پھینک دوں۔ استعمال کرنے سے پہلے باقی کو اچھی طرح دھوئیں اور مناسب سائیں سے محفوظ خطائی اپنیں۔ کوکھلی سائیں، جوتے، خلائس خاص با احتیاطی لین سیر صرف ہوا کے چلنے کی سمت میں اسیر کر کے ہونے کے اس کے خلاف جانک سے تھر سے پھینک دے۔ تھر وکالسی کے اندر کر کے نہ دکھائیں، جانک پرنی ساگریز ٹولز نہ کریں یا تھوکات، سائیں، ڈال انھوں کے ساتھ سائیں سے بھیجیں۔ پرنی ضمانت: کمزوری، پھوکات، سائیں کی۔ کوکھلی کی دھنسی نظر کی جان۔ ڈال اور پرنی سائیں کا نخلام جانک شوش جانک کی سہائیت اسپل، فوئیلر اور ٹولز چشمہ، ایٹائی سٹی: انداز: ۱۔ اگر کوکھلی جاتے: اگر شخص ہوش میں ہو پویشیار ہو تو سب سے دھوئیں اور ۱ یا ۱ گالن پانی پیئے کے لیے، پرنی ہوش شخص کو منہ سے کچھ نہ لے کر ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب تک ایک اور شخص پانی پیئے یا خلائے خواہن نہ ہو تب تک نہ کریں۔ جب تک ایک اور شخص میں صورت میں، مرض کو دوا میں لے جائیں اور جسم کے درجہ حرارت کا خیال کریں۔ اگر مرض خلائے نہیں لے یا دوا میں سائیں نہیں لیں شکاری ہو تو جرحی طور پر منہ سے سائیں کے ساتھ سائیں سے سائیں سائیں۔ جس معالج سے شوروہ کریں۔ ۱۔ چھہ کے رائلٹی کی صورت میں: جسم کے متاثرہ حصے کو صاف اور آفری پانی لے لیں اچھی طرح دھوئیں بشمول بالوں اور نخلوں کے نیچے۔ اگر دلائی یا جان بقرار رہے۔ ایک ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ تمام دلو کیڑوں کو استعمال کرنے سے پہلے الگ الگ الگ ایل طرح جسم میں کر کے الگ الگ دھوا چھپائے۔ انھوں سے رابطہ کرنے کی صورت میں: کم از کم ۱۵ منٹ تک کافی قدر میں پانی سے شستہ دھو لیں۔ اگر درمیں جان یا فو تو پویشیار رہے۔ انھوں کے مفرق سے ایک مناسب استعمال پودے پر پورکٹ: Phytotherapy سے مشورہ کریں۔

Tebuconazole a.i.	6.7 % w/w
Captan a.i.	26.9 % w/w
Polyaryl phenyl ether phosphate	2.1 % w/w
Sodium Naphthalene formaldehyde condensate	1.00 % w/w
Modified-dimethyl polysiloxane	0.6 % w/w
Propylene glycol	5.9 % w/w
Xanthan gum	0.25 % w/w
Water	Q.S. %

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.